

圆形,长1毫米,被毛及腺点。花期7—10月,果期9—10月。

产四川西北部、西部(天全、康定、马边、石棉、茂理、泸定、小金、松潘)及云南西北部(德钦)。生于低山及亚高山开旷草地及灌丛中,海拔180—2700米。

此种在茎和叶两面被腺毛的种中,以头状花序较小,总苞片白色而基部浅褐色为区别。头状花序极似香青 *A. sinica* Hance,但此种茎高大,木质,有分枝为区别。此种叶形多变异,有时宽短或倒卵圆形。

30. 德钦香青

Anaphalis larium Hand.-Mazz., *Symb. Sin.* 7: 1104, t. 16, f. 13. 1936;
S. Y. Hu in *Quart. Journ. Taiw. Mus.* 18, 1—2: 109. 1965.

根状茎细长,木质;根出条短,被膜质卵圆形鳞片状叶,有顶生的莲座状叶丛。茎多数丛生,直立,高15—30厘米,纤细,挺直,有沟,草质,被白色蛛丝状棉毛,下部不久脱毛,不分枝、全部有较密集的叶。下部叶在花期枯萎;中部至上部叶渐宽大,开展,倒披针状椭圆形至倒披针形,长2.5—4厘米,宽0.7—1.2厘米,基部渐狭或急狭,沿茎下延成楔形的短翅,边缘平,顶端急尖,有小尖头;顶部叶较小;全部叶质稍厚,两面被浅黄色密棉毛,有向叶上部渐消失的离基三出脉,中脉细,在下面稍凸起。头状花序达十余个,密集成复伞房状,花序梗长约2毫米,被浅黄色棉毛。总苞宽钟状,长5—8毫米,径5—6毫米;总苞片3—4层,直立;外层倒卵圆形,深褐色,长2.5毫米,被棉毛;内层匙状椭圆形,长4毫米,宽约2毫米,顶端钝,浅黄白色;最内层匙状线形,长3.5毫米,有长达全长三分之二的爪部。雄株头状花序全部有雄花。花冠长约3毫米。冠毛污白色,上部渐粗厚,有细锯齿。花期8—9月。

产云南西北部(德钦)。生于高山或亚高山干燥坡地,海拔3000—4250米。

根据本种的原始记载,茎无翅,叶线状披针形,仅有中脉,与上述的记载不符合。但上述的标本是从模式产地(德钦多克拉)采得,且与模式标本的照片相符合,应视为同一个种。此种植物的下部节间有不明显的翅,但上部叶显然沿茎下延成楔形的翅。雌株未见到。

系5. 锐叶系——*Ser. Oxyphyllae* Ling, *植物分类学报*, 11: 95. 1966.

多年生草本;根状茎细;叶沿茎下延成宽或狭翅,向茎上部渐大,且在花序周围密集成放射状;总苞长5—6毫米。花托有缝状短毛。

系的模式:锐叶香青 *A. oxyphylla* Ling et Shih

31. 锐叶香青 图版 28: 12—22