

var. **gracilis**——*Anaphalis gracilis* Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 1103. t. 17, f. 5. 1936, et in Act. Hort. Goth. 12: 244. 1938; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiw. Mus. 18, 1—2: 107. 1965; 中国高等植物图鉴 4: 470. 图 6354, 1975.

茎高 5—30 厘米, 被白色蛛丝状棉毛, 上部被白色棉毛。叶线形或线状披针形, 长 1—2.5 厘米, 宽 0.1—0.3 厘米, 上面被蛛丝状毛或疏棉毛, 下面被灰白色蛛丝状密棉毛, 边缘反卷。

产四川西部及西北部(松潘、道孚、太宁、康定、雅江)。生于高山干旱坡地和石砾地, 海拔 3200—4000 米。

纤枝香青糙叶变种

var. **aspera** Hand.-Mazz. in Act. Hort. Goth. 12: 244. 1938; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiw. Mus. 18, 1—2: 107. 1965.

茎高达 40 厘米, 被头状具柄腺毛, 上部还被蛛丝状毛。叶形略同上, 长 1.5—2.5 厘米, 宽 0.15—0.35 厘米, 有时长达 4 厘米, 上面绿色, 被头状具柄腺毛, 下面被白色蛛丝状毛。

产四川西北部及西部(甘孜、马尔康、理县)。生于高山及亚高山灌丛中和山谷坡地, 海拔 2600—3500 米。

纤枝香青皱缘变种

var. **ulophylla** Hand.-Mazz. in Act. Hort. Goth. 12: 244. 1938; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiw. Mus. 18, 1—2: 108. 1965.

茎较高大, 有较粗壮的分枝, 被蛛丝状毛和头状具柄腺毛。叶线形, 线状倒披针形或披针形, 长 1.5—3.5 厘米, 宽 0.3—0.7 厘米, 基部渐狭, 沿茎下延成较宽的翅, 上面被蛛丝状毛和头状具柄腺毛, 下面被灰白色密棉毛, 边缘波状反卷, 顶端尖或渐尖。根出条长, 常作匍枝状。

产四川西北部至西南部(松潘、大金、小金、太宁、雅江等)和云南西北部(德钦)。生于亚高山草坡、沟谷、溪岸, 海拔 2060—3000 米。常见。

系 7. 木根系——Ser. *Xylorhizae* Ling, 植物分类学报, 11: 96. 1966.

根状茎粗壮, 木质, 灌木状; 茎不分枝, 草质, 下部叶在花期常生存; 叶沿茎下延成狭翅; 总苞长 5—7 毫米; 花托有缝状突起或毛。

系的模式: 木根香青 *A. xylorhiza* Sch.-Bip.