

片硫黄色,基部黑褐色。

产四川西部(康定、德格、马尔康)。

淡黄香青淡红变型 *f. rosea* Ling, 植物分类学报, 11: 111. 1966. 总苞片淡红色,基部深褐色。

产青海东部(青海湖边)、甘肃南部(岷县)、四川西部(九龙、大渡河上游、乾宁等)、西藏东部和南部(拉萨)等。

淡黄香青与其它香青的天然杂种有: 淡黄×川西香青 *A. flavescens* × *souliei* (Hand.-Mazz. l. c. 12: 249. 1938), 全株被白色或灰白色蛛丝状棉毛, 茎有疏生的叶与川西香青相似, 但总苞大而浅黄色与淡黄香青相同。产四川西部(东俄洛、折多山、太宁)。乳白×淡黄香青 *A. lactea* × *flavescens*? (Hand.-Mazz. l. c. 12: 248. 1838), 植株粗壮, 高 33 米, 茎直立, 有较密集的叶, 叶形及毛茸似淡黄香青, 但头状花序较多数而总苞片白色、与乳白香青接近。产四川西北部(松潘、阿坝、黑水)。淡黄×乳白香青 *A. flavescens* × *lactea*, 与上一杂种相反, 此杂种植株粗壮, 高达 40 厘米, 茎和叶被灰白色密棉毛与乳白香青接近, 但头状花序大, 长达 10 毫米, 径约 10 毫米, 总苞片淡黄色, 有光泽, 与淡黄香青接近。产甘肃东部(榆中、吉不拉山)及四川(大马厂)。铃铃×淡黄香青 *A. hancockii* × *flavescens*, 植株粗壮, 高达 35 厘米, 茎直立, 上部被白色蛛丝状密棉毛, 叶两面被蛛丝状毛及具柄头状腺毛, 边缘被灰白色蛛丝状长毛, 似铃铃香青, 但总苞片浅黄色而有光泽, 与淡黄香青相同。产青海(大通)、甘肃(岷县)及西藏。

淡黄香青棉毛变种

var. lanata Ling, 植物分类学报, 11: 111. 1966.

茎和叶两面被白色或灰白色厚棉毛; 莲座状叶和茎下部叶匙状或倒披针状长圆形, 长 1.5—2.5 厘米, 宽 0.5—0.7 厘米; 总苞长 8—10 毫米, 总苞片浅黄色。

产四川西部(无详细产地)。

淡黄香青在四川西部名“铜钱花”, 为治疮癣药。此名称在四川西部也用于铃铃香青 *A. hancockii* Maxim.。

48. 铃铃香青 铃铃香(河北), 铜钱花(四川) 图版 35: 1—9

Anaphalis hancockii Maxim. in Bull. Ac. St. Pétersb. 27: 478. 1881; Kanitz. in Bot. Res. Szech. Centr. As. Exped. 9: 1884; Diels in Engl., Bot. Jahrb. 36: 104. 1905; Kitam. in Act. Phytotax. et Geobot. 12: 134. 1922; Mattf. in Journ. Arn. Arb. 14: 37. 1933; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Goth. 12: 248.