

3—4 齿裂,具腺点,花柱分枝纤细。两性花较少,通常 5—7 个,花冠管状,长约 3 毫米,上部稍扩大,檐部 5 裂,裂片浑圆,具腺点。瘦果圆柱形,长约 0.5 毫米,具乳头状突起。冠毛白色,长约 3 毫米。 花期 8—10 月。

产台湾、福建、江苏、浙江、江西、湖南、广东、广西、贵州、云南、四川等省区。生于山坡、路旁或灌丛中,在我国东南部地区海拔为 500—600 米,西南部地区海拔 2500—3000 米。也分布于菲律宾、中南半岛、缅甸及印度北部。


2. 拉萨鼠麴草(新拟) 图版 36: 1—3

*Gnaphalium flavescens* Kitam. in Act. Phytotax. et Geobot. 15: 71, fig. 7. 1953.

多年生草本。茎上升,稍弯,高 14—16 厘米,基部径 1—1.2 毫米,丛生,基部通常木质,中部和中上部有分枝,具细沟纹,分枝密被紧贴的蛛丝状棉毛,主茎基部多少脱毛,节间长 5—10 毫米。基生叶近于花期萎谢,比中部叶小,线形,长 10—12 毫米,宽约 1.5 毫米;中部叶披针形或卵状披针形,长 15—18 毫米,宽 2—3 毫米,基部扩大而抱茎,顶端具短尖头,边缘狭反卷,上面绿色,被疏蛛丝状毛,下面被白色密棉毛,有 1 两面稍显著的中脉;上部叶卵形或卵状长圆形,长 10—15 毫米,宽 3—5 毫米,基部极扩大,顶端钝或有极细的短刺尖,两面被白色密棉毛。头状花序多数,径 4—5 毫米,具梗,在茎枝顶端排列成复伞房花序,花黄色;总苞钟形,径约 4—5 毫米;总苞片 4—5 层,有光泽,干时污白色而带淡黄色,外层卵形,长 2—2.5 毫米,顶端略钝,基部增厚呈红褐色,背面被白色棉毛,中层长圆形或倒卵状长圆形,长 3—4 毫米,顶端浑圆或有时具齿刻,下部增厚呈红褐色,基部略被白色棉毛,最内层倒卵状长圆形,长 4.5—5 毫米,中部以下极狭,顶端钝、浑圆或有时具齿刻,中部增厚呈红褐色,背面无毛或近无毛;花托微凸,无毛。外围的雌花多数,花冠丝状,长 2.5—3 毫米,上部扩大,檐部通常 4 齿裂,有时 3 或 5 裂,裂片不整齐,顶端被棒状毛,花柱分枝略扁,顶端钝,盘花冠檐 5 齿裂。瘦果长圆形或略带椭圆形,长约 1 毫米,被乳头状突起。冠毛粗糙,污白色,易脱落,长约 3.5 毫米。 花期 8—11 月。

产西藏拉萨附近。生于山坡上。模式标本采自西藏拉萨。

本种总苞片干时污白而带有淡黄色,略似香青属 *Anaphalis*, 但头状花序全部小花均能结实。边花较纤细,花冠顶端通常不整齐 4 齿裂,有时 3 齿裂或 5 齿裂者(盘花花冠 5 齿裂)。仅存的钟补求(1952 年 11 月 10 日采自西藏拉萨北山)的 5592 号标本可能是雌株。无疑,该标本属于 Kitamura 的 *Gnaphalis flavescens*。新种记载未指明盘花是否为两性花,有待今后研究。



1—3. 拉萨鼠麴草 *Gnaphalium flavescens* Kitam., 1. 花枝; 2. 雌花; 3. 总苞片。4—11. 金头鼠麴草 *Gnaphalium chrysocephalum* Franch., 4. 花枝; 5. 叶和茎(示叶基下延); 6. 头状花序; 7. 两性花; 8. 雌花; 9. 雄蕊; 10. 花柱枝; 11. 总苞片。(余汉平绘)