

头状花序多数,球形,密集成复球状;总苞亮黄褐色,总苞片短尖。

据文献记载此变种产云南东部(东川),但未见标本。模式标本采自云南。

6. 金头鼠麴草 图版 36: 4—11

Gnaphalium chrysocephalum Franch. in Morot, in Journ. de Bot. 10: 412. 1896; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1105. 1936.

草本。茎直立,高60—80厘米,基部径约5毫米,通常不分枝,有沟纹,密被短柔毛状腺毛,上部有时被棉毛,节间长15—30毫米。基部叶密集,在花期凋落;中部的叶无柄,狭披针形或线状披针形,长4—7厘米,宽11—15毫米,基部延茎下沿成翅,顶端短尖,上面略粗糙,除中脉被薄棉毛外,均密被短柔毛状腺毛,下面密被白色棉毛,叶脉1条,在上面明显,在下面凸起;上部叶线形或线状披针形,长3.5—5厘米,宽3—7毫米,顶端通常渐尖。头状花序多数,有短细梗,径约5毫米,在校端密集成球状又作大的伞房花序式排列;花黄色;总苞钟形,径约5毫米;总苞片3层,外层倒卵状长圆形,金黄色,有光泽,背面基部被白色棉毛,顶端浑圆,长约4毫米,中层倒卵形或倒卵状长圆形,亮黄色,背面基部疏被棉毛或无毛,顶端浑圆,与外层几等长,内层倒卵状长圆形或近匙形,色泽较淡,顶端薄而带浑圆,无毛,长3—4毫米。雌花多数,花冠丝状,长约4毫米,顶端扩大,檐部3—4浅裂,裂片顶端正圆或浑圆,无毛,花柱分枝顶端钝。两性花多数,花冠管状,长4—5毫米,向上渐扩大,檐部5浅裂,裂片顶端多变异,卵状渐尖或短尖,无毛。瘦果圆柱形或几椭圆形,无毛,长约1毫米。冠毛白色,糙毛状,易脱落,长约4毫米。花期6—10月。

产云南、贵州、四川。生于山坡草丛中,海拔2600—2800米。模式标本采自云南。

组2. 鼠麴组——Sect. *Gnaphalium*.——Sect. *Eugnaphalium* DC., Prodr. 6: 222. 1837. p. min. p.

头状花序在茎枝顶端或叶腋密集成球状或团伞花序状;总苞片草质,麦秆黄色、灰色或棕褐色。

7. 湿生鼠麴草(中国高等植物图鉴) 图版 37: 1—4

Gnaphalium tranzschelii Kirp. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS. 19: 352. 1959 et in Fl. URSS. 25: 384. 1959; 中国高等植物图鉴 4: 475. 图 6363. 1975.——*Gnaphalium uliginosum* L., Sp. Pl. 856. 1753. p. p.——*Gnaphalium uliginosum* L. β . *lasiocarpum* Ledeb., Fl. Ross. 2: 609. 1845—1846. p. p.