

状花花冠长约5毫米,冠毛1层,白色,几与两性花花冠同长,有约20个微糙毛。瘦果长1.5毫米,被白色绢毛。花期7—9月,果期10月。

产云南南部(元江、屏边)。生于低山开旷坡地,海拔1200—1650米。模式标本采自云南元江。

此种与泽兰羊耳菊极近似,但叶上端非渐尖,下面仅有较疏的粗毛;花序较疏;总苞较长,总苞片被粘质腺毛;舌状花较短。

17. 泽兰羊耳菊

Inula eupatorioides DC. Prodr., 5: 469. 1836; C. B. Clarke, Comp. Ind. 125. 1876; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 3: 295. 1881; Dunn, in Journ. Linn. Soc. Bot. 39: 459. 1911; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiw. Mus. 19, 3—4: 297. 1966.——*Conyza eupatorioides* Wall., Cat. 2993. 1831.——*Solidago heterotricha* Wall., Cat. 2275. 1831.——*Amphirhapis heterotricha* DC., l. c. 343. 1836.——*Duhaldea eupatorioides* Steetz, Bonplandia 5: 308. 1857.

灌木,多分枝,高1—2米。分枝粗壮,径达7毫米,有深沟,被密生的黄褐色的伏粗毛和乳头状糙毛,后脱毛,上部被极密的粗茸毛,有较密的叶,叶脱落后有被长绢毛的腋芽。叶开展,长圆形或椭圆状披针形,长10—18厘米,宽4—6厘米,基部急狭或钝,无柄或有长达5毫米的叶柄,顶端渐尖,边缘有小尖头状疏齿,皮纸质,上面被密糙毛,下面除被疏糙毛外沿脉和边缘被长糙毛,中脉和10—15对侧脉在下面凸起并在近叶缘处相互联接,网脉细密,在下面高起;上部叶小,基部圆形,无柄。头状花序小,径5—7毫米,极多数在枝端密集成径达十余厘米的伞房圆锥花序;花序梗细,长3—7毫米,被密粗毛及糙毛,有卵圆披针形苞叶。总苞近钟状,长约4毫米,径达5毫米;总苞片4—5层,长圆状披针形,顶端尖,稍厚质,被粗茸毛,外层较内层约短四倍,内层线状披针形,上部被短茸毛,稍有缘毛。舌状花黄色;舌片长圆形,长达5毫米,花柱分枝顶端稍尖;管状花花冠长约5毫米,有卵圆形尖裂片;花药顶端尖。冠毛黄白色,较管状花花冠稍短,有20余个顶端稍厚的微糙毛。瘦果圆柱形,长2毫米,被黄白色绢毛。花期秋季,果期12月。

此种分布于不丹、印度、缅甸、老挝、越南等地,也可能产于我国西藏南部。据前人报告(Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot., 39: 459. 1911),此种产我国云南南部(蒙自)。但云南的标本(Henry, 11324)根据照片似为滇南羊耳菊 *I. wismanniana* Hand.-Mazz., 故此种在云南的分布尚待证实。

凸尖羊耳菊