

*lipskyi* var. *przewalskyi* auct. non Winkl.; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Goth. 12: 251. 1938.

多年生草本。茎直立，高30—50厘米，被污黄色绒毛状长柔毛，有时极密，基部直径2—4毫米，除花序梗外，通常不分枝。基叶宿存，3—4枚丛生，椭圆形，长4—10厘米，宽2—4.5厘米，先端钝或锐尖，基部阔楔形，下延成具宽翅的短柄，边缘具稍不规整具胛尖尖的锯齿，上面密被具球状膨大基部的倒伏硬毛状长毛，下面密被绒毛状长柔毛，沿中肋尤密；茎下部叶与基叶相同，有时具较长的叶柄，柄长3—10厘米，具向下渐狭的阔翅，基部半抱茎状；中部叶显著缩小，椭圆状披针形，先端锐尖或钝，基部渐狭，无柄，半抱茎状，上部叶狭披针形。头状花序单生茎端及叶腋，成总状花序式排列，生于下部叶腋的具长3—5厘米的花序梗，生于上部叶腋的具短梗或几无梗；苞叶多枚，披针形，其中1—2枚稍大，长10—15毫米，其余约与总苞等长，先端稍钝，具胛尖头，密被长柔毛及腺点。总苞扁球形，长5—6毫米，直径8—12毫米；苞片4层，近等长，外1—2层披针形或上部稍增宽而略呈条状匙形，上半部草质，被长柔毛，基部干膜质，内层干膜质，披针形，先端钝。雌花狭筒状，长1.5—2毫米，冠檐5齿裂，被极稀疏的柔毛或几无毛，两性花筒状，长2.5—3毫米，向上稍宽，被极稀疏的柔毛，冠檐5齿裂。瘦果长约3毫米。

产四川西部。生于山坡路边及林下，海拔2000—3200米。模式标本采自四川武平。

### 9. 暗花金挖耳 (中国高等植物图鉴) 东北金挖耳(东北植物检索表)

*Carpesium triste* Maxim. in Bull. Acad. Sci. Petersb. 19: 479. 1874; Winkl. in Act. Hort. Petrop. 14: 59. 1895; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1107. 1936; Kitamura in Mem. Coll. Sci. Kyoto Univ. ser. B. 13: 279. 1937; Golub. in Fl. URSS. 25: 503. 1959; 中国高等植物图鉴 3: 485. 图 6383. 1975. —*C. manshuricum* Kitamura in Act. Phyt. et Geobot. 4: 71. 1935. —*C. triste* var. *manshuricum* Kitamura in Mem. Coll. Sci. Kyoto Univ. ser. B. 13: 280. 1937.

### 暗花金挖耳(原变种)

#### var. *triste*

多年生草本。茎高30—100厘米，被开展的疏长柔毛，近基部及叶腋较稠密，中部分枝或有时不分枝。基叶宿存或于开花前枯萎，具长柄，柄与叶片等长或更长，上部具宽翅，向下渐狭，叶片卵状长圆形，长7—16厘米，宽3—8.5厘米，先端锐尖或短