

14. 薄叶天名精

Carpesium leptophyllum Chen et C. M. Hu, 植物分类学报 12 (4): 499. pl. 99, f. 1—6. 1974.

薄叶天名精(原变种)

var. **leptophyllum**

多年生草本。根丛生,纤维状。茎高 40—80 厘米,通常不分枝,基部圆柱状,上部有明显的纵条纹,被疏柔毛。基叶早凋,茎下部及中部叶卵形或椭圆状卵形,近膜质,长 7—11 厘米,宽 4—6 厘米,先端锐尖或短渐尖,基部近圆形或近截形,骤然下延成顶部近于翅状的叶柄,边缘具略呈浅波状的浅齿,上面被稀疏柔毛,下面沿中肋及侧脉有极稀疏的柔毛,余部近于无毛;叶柄长 2—6 厘米;上部叶卵状披针形至披针形,先端渐尖,基部楔状渐狭,具短柄或近于无柄。头状花序单生茎端及上部叶腋,近无梗,成穗状花序式排列,无苞叶或有时具 2—3 枚狭披针形,长 5—12 毫米的苞叶。总苞钟状,长约 5 毫米,直径 4—6 毫米;苞片 3—4 层,干膜质,外层较短,卵状披针形,无毛,内层矩圆形,长约 5 毫米,先端钝,有不规整的小齿。雌花狭筒状,长约 1.5 毫米;两性花筒状,长 2—2.5 毫米,上部稍扩大,冠檐 5 齿裂。瘦果长约 3 毫米。

产四川峨眉山、洪雅、天全、巫溪等地。生于山地草坡及林缘,海拔 2000—2700 米。模式标本采自四川峨眉山。

本种外貌近似于四川天名精 *C. szechuanense* Chen et C. M. Hu, 但叶近膜质,背面几无毛,头状花序遥小,总苞外层苞片干膜质,无毛而不同。

狭苞薄叶天名精

var. **linearibracteatum** Chen et C. M. Hu, 植物分类学报 12 (4): 500. pl. 99, f. 7—8. 1974.

本变种与原变种不同主要在于:茎上部圆锥状分枝;茎上部及枝上叶狭披针形;头状花序多数,苞叶条形或条状披针形,较总苞稍长或超过总苞 2—3 倍。

产四川宝兴县及峨眉山。生于山地草坡及林缘,海拔 2000—3000 米。模式标本采自四川宝兴。

15. 四川天名精

Carpesium szechuanense Chen et C. M. Hu, 植物分类学报 12 (4): 499. pl. 98. 1974.

多年生草本。根茎粗短,具多数纤维状粗根,茎直立,高 50—80 厘米,圆柱形,具不明显的纵条纹,被稀疏或稍密的短柔毛并杂以少数开张的长毛,中部以上分枝。基