

疏柔毛，筒部长近3毫米；管状花花冠黄色，长约4毫米，下部骤然收缩成细管状，檐部5裂，裂片长圆形，顶端钝，被疏短毛。瘦果倒卵形，长约4毫米，宽近3毫米，具3—4棱，基部尖，顶端宽，截平，被密短柔毛。无冠毛及冠毛环。花期几全年。

产台湾、广东南部及其沿海岛屿、广西、云南等地。生草地、林下或灌丛中，海岸干燥砂地上也时常可见。印度、中南半岛、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、日本及大洋洲也有分布。

2. 麻叶蟛蜞菊

Wedelia urticifolia DC. in Wight, Contrib. Bot. Ind. 18. 1834, et Prodr. 5: 539. 1836. p. p.; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 3: 306. 1881; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 434. 1888; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1109. 1936.

直立或斜升草本，有时呈攀援状。茎圆柱形，高20—80厘米或达1米，分枝，有粗沟纹，被稍开展的糙毛或下部脱毛，节间长9—15厘米。叶有5—40毫米的柄，叶片卵形或卵状披针形，连叶柄长10—13厘米，宽3—7厘米，基部通常短楔尖或稀浑圆，顶端渐尖，边缘有不规则的锯齿或重齿，上面被有基部为疣状的糙毛，下面的毛较细密，近基出三脉，中脉中部以上常有1—3对侧脉，网脉通常明显；上部叶小，有短柄或无柄，叶片披针形，长2.5—6厘米，宽1—2.5厘米，基部通常浑圆，稀楔尖，顶端短尖或渐尖。头状花序少数，径达2—2.5厘米，每两个生叶腋，或单生枝顶；花序梗长2—3厘米，稀达6厘米或更长，被白色开展的糙毛；总苞阔钟形或半球形，径约15毫米；总苞片2层，外层叶质，绿色，长圆形或倒披针形，长约8毫米，宽3—4毫米，顶端渐尖，背面密被长粗毛，内层长圆形至倒卵状长圆形，长5—6毫米，顶端钝，被疏毛；托片折叠成长圆形，长约8毫米，顶端芒尖或中央的骤然紧缩成芒状刺尖，背面及上部边缘被粗毛。舌状花1层，黄色，舌片卵状长圆形，长约11毫米，宽约4毫米，顶端2齿裂，稀3裂，管部短，长3—4毫米。管状花多数，黄色，檐部5浅裂，裂片三角状渐尖，被疏毛。瘦果倒卵形、背腹略扁，长约4毫米，宽2—3毫米，褐红色，密被白色疣状突起，顶端收缩而近浑圆，收缩部分密被毛。冠毛短刺芒状，2—3个，不等长，基部有冠毛环。花期7—11月。

广产云南、贵州、广西、湖南南部、广东及其沿海岛屿。生溪畔、谷地、坡地或空旷草丛中。也分布于印度、中南半岛及印度尼西亚。

3. 山蟛蜞菊(海南植物志)

Wedelia wallichii Less. in Linnaea 6: 162. 1831; Hook. f., Fl. Brit.

Ind. 3: 307. 1881; Chang in Sunyats. 3: 294. 1937; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Goth. 7: 253. 1938.

直立草本。茎高60—80厘米，圆柱形，分枝，有沟纹，被糙毛或老时脱毛，节间长4—10厘米，在上部有时达15厘米。叶有长达1—2厘米的柄，叶片卵形或卵状披针形，连叶柄长6—11厘米，宽3—4厘米，基部浑圆或楔形，顶端渐尖，边缘有圆齿或细齿，两面被基部为疣状的糙毛，惟有时下面的毛细密，近基出三脉，在上面平坦，在下面略凸起，中脉中、上部常有1—2对侧脉，网脉不明显；上部叶小，披针形，有短柄，连叶柄长4—5厘米，宽10—17毫米。头状花序较小，径达15毫米，通常单生于叶腋和茎顶；花序梗细弱，长3—5厘米，被向上贴生的糙毛；总苞钟形，高与顶端宽近相等，约7—10毫米，基部狭，径仅5毫米或更狭；总苞片2层，外层绿色，叶质，长圆形，长约10毫米，顶端钝或短尖，背面被贴生的糙毛，内层长圆形至披针形，长约7毫米，背面上端被疏毛，顶端渐尖，托片折叠成长圆形，顶端芒尖，被疏毛，上部边缘常有少数裂齿。舌状花1层，黄色，舌片长圆形，长4—6毫米，宽约2毫米，顶端2—3齿裂，筒部短，长约1毫米。管状花向上端渐扩大，檐部5裂，裂片长圆形，顶端钝，被疏短毛。瘦果倒卵状三棱形，略扁，长约5毫米，宽约为长的二分之一，红褐色而具白色疣状突起，顶端收缩成浑圆，上部被细短毛，收缩部分的毛较密。冠毛2—3个，短刺芒状，生于冠毛环上。花期4—10月。

广产我国南部和西南部各省区。生于溪边、路旁或山区沟谷中，常见，海拔500—800米，在云南地区海拔达1200—3000米。印度、中南半岛也有分布。

本种有毒，猪、牛、羊和家兔误食能致死。

4. 卤地菊(种子植物名称补编)

Wedelia prostrata (Hook. et Arn.) Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 434. 1888; Kitam. in Mem. Coll. Kyoto Univ. ser. B. 16: 259. 1942. —*Verbesina prostrata* Hook. et Arn., Beech. Voy. 195. 1836. —*Wollastonia prostrata* Hook. et Arn., l. c. 265. 1836. —*Eclipta dentata* Lévl. et Vaniot in Bull. Acad. Géogr. Bot. 20: 11. 1910.

一年生草本。茎匍匐，长25—80厘米或更长，基部径约2毫米，分枝，基部茎节生不定根，茎枝疏被基部为疣状的短糙毛，糙毛有时成钩状，节间长2—4厘米，或在上部可达6—8厘米。叶无柄或有1—5毫米长的短柄，叶片披针形或长圆状披针形，连叶柄长1—4厘米，宽4—9毫米，基部稍狭，顶端钝，边缘有1—3对不规则的粗齿或细齿，稀全缘，两面密被基部为疣状的短糙毛，中脉和近基发出的1对侧脉，不明