

Hort. Petrop. 25: 641. (Fl. Mansh. 3) 1907; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39: 418. 1911; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 18: 118. 1965.

一年生草本，高20—30(40)厘米。茎多数外展或上升，上部有分枝，疏被短柔毛。叶全形矩圆形，二回羽状全裂，小裂片条形或披针形，顶端急尖，下面疏被柔毛。头状花序单生枝端，直径1—2厘米，有长梗；总苞片卵状矩圆形，稍被柔毛，顶端及边缘宽膜质，外层尖，内层钝；花托长圆锥形，有时缩短；托片披针形，龙骨状，顶端凸尖；雌花舌片椭圆形，白色，管部具翅，有乳头状突起；两性花花冠管状，5齿裂，基部有时扩大。瘦果陀螺状四棱形，有沟纹，平滑，顶端边缘瘤状肿大。花果期6—7月。

原产欧洲。我国东北铁路沿线偶有野生，山东可能有栽培。

3. 臭春黄菊 图版3: 1; 图版2: 1

Anthemis cotula L., Sp. Pl. 2: 894. 1753; Boiss. Fl. Or. 3: 315. 1875; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39: 418. 1911; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 18: 118. 1965. — *A. foetida* Lam., Fl. Fr. 2: 164. 1778. — *Maruta foetida* Cass. in Dict. Sc. Nat. 29: 174. 1823. — *M. cotula* DC., Prodr. 6: 13. 1837; Ledeb., Fl. Ross. 2: 526. 1844—46.

一年生草本，有臭味，高30—50厘米。茎直立，疏生柔毛或近无毛，有伞房状分枝。叶全形卵状矩圆形，二回羽状全裂，小裂片狭条形，顶端短尖，有腺点，近无毛。头状花序单生枝端，直径1—2厘米，有长梗；总苞片矩圆形，顶端钝，边缘狭膜质；花托长圆锥形，下部小花无托片；托片条状钻形；舌状花舌片白色，椭圆形；管状花两性，5齿裂，基部翅状扩大。瘦果矩圆状陀螺形，有多数小瘤状突起，无冠毛，但各条肋在顶部边缘形成圆齿状。花果期6—7月。

原产欧洲。见我国东北地区，栽培，极少野生，浙江可能有栽培。

91. 果香菊属——*Chamaemelum* Mill.

Mill. Gard., Dict. Abridg. ed. 4, 28, 1754; Cass. in Dict. Sc.

Nat. 29: 179, 185, 1823.

草本植物，有强烈香味。叶互生，二至三回羽状全裂。头状花序多数，单生于枝端，具异型或同型花；总苞宽碟形，直径6—12毫米；总苞片3—4层，覆瓦状排列，草质，边缘膜质，顶端膜质部分扩大。舌片白色，花后向下反折，管部基部明显向下增生而包围子房顶部；管状花多数，两性，花冠黄色，5齿，基部多少囊状扩大包围子房顶部，并斜向果背延伸。花柱分枝狭线形，顶端截形。花药基部钝，顶端具卵状披针形附片。瘦果三棱状圆筒形，稍侧扁，顶端圆形，基部收狭，具3(4)凸起的细肋，无冠状冠毛。

本属2—3种，主要分布南欧与北非。下列1种在欧洲和其他地区观赏或药用栽培，甚少野生。我国有引种。



1. 臭春黄菊 *Anthemis cotula* L.: 植株上部。2. 褐苞蓍 *Achillea impatiens* L.: 植株全形。3. 丝叶蓍 *Achillea setacea* Waldst. et Kit.: 植株全形。(路桂兰绘)