

具柄，长5—30厘米，宽2—12厘米，被密毛，茎生叶无柄，较小，被较少的毛。头状花序近球形，直径5毫米，集成紧密或很少疏松的伞房花序；总苞片矩圆形，边缘宽膜质，背面被疏长毛；托片膜质；小花多数，管状，黄色，长2毫米，宽1毫米，倒圆锥形，顶端5裂，被腺点。瘦果楔形，黄褐色，长1—1.5毫米，宽0.3—0.5毫米，顶端有齿状冠毛。

产我国新疆北部。苏联中亚地区也有分布。未见到标本。上面的描述是根据《苏联植物志》和参考苏联标本写成的。

2. 菊亚族——CHRYSANTHEMINAE O. Hoffm.

O. Hoffm. in Engl. et Prantl. Pflanzenfam. 4 (5) 273. 1889—
1894; Tzvel. in Fl. URSS 26: 129, 1961.——Trib. *Senecionideae* Less. subtrib. VI. *Chrysanthemeae* Less. 2. *Chrysanthemeae* Less., Synops. Comp. 250, 1832 et subtrib. VII. *Artemisieae* Less. 2. *Cotuleae* Less. et 4. *Artemisieae* Less. l. c. 260, 263.

花托无托毛或有托毛，但绝无托片。

94. 木茼蒿属——*Argyranthemum* Webb., ex Sch.-Bip.

Sch.-Bip. in Webb et Berth. Phyt. Canar. 2: 258. 1842.——
Chrysanthemum sect. *Magarsa* DC., Prodr. 6: 65. 1837.——
Chrysanthemum sect. *Argyranthemum* (Webb. ex Sch.-Bip.)
Benth. et Hook. f., Gen. Pl. 2: 426. 1876, p. p.

半灌木。头状花序异型，多数，在茎枝顶端排成不规则伞房花序。边缘舌状花雌性，1层，中央盘状花两性管状。总苞碟状。总苞片3—4层，硬草质。花托极突起，无托毛。舌状花白色，舌片线形或线状长圆形。管状花黄色，花冠下半部狭管状，上半部突然扩大成宽钟状，顶端5齿裂。花柱分枝线形，顶端截形。花药基部钝，顶端有卵状披针形的附片。瘦果多样：边缘舌状花瘦果有3条具宽翅的肋及不明显的间肋，顶端有冠状冠毛，冠状冠毛的冠缘不整齐；管状花瘦果有5—8条椭圆形的肋，其中1条或2条腹肋强烈突起（在边缘两性花的瘦果成狭翅状），顶端有冠状冠毛。

本属约10种，几全部集中于北非西海岸加那利群岛。

属模式种：*Argyranthemum frutescens* (L.) Sch.-Bip.

1. 木茼蒿 图版2: 2

Argyranthemum frutescens (L.) Sch.-Bip. in Webb et Berth., Phyt. Canar. 2: 264. 1842.——*Chrysanthemum frutescens* L., Sp. Pl. 877. 1753; 侯宽昭等，广州植物志，505. 1956; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 19: 27. 1966.——
Pyrethrum frutescens (L.) Willd., Sp. Pl. 3: 2150. 1803; DC., Prodr. 6: 65. 1837.