

缘冠齿。花果期5—10月。

公园栽培观赏。但河南、江西、甘肃有归化野生类型，生山坡草地或河边。欧洲、苏联、北美、日本等地，野生、引种栽培观赏或归化逸生等各种类型都有。

还有1种：

2. 大滨菊

Leucanthemum maximum (Ramood) DC., Prodr. 6: 46. 1837.—*Chrysanthemum maximum* Ramood in Bull. Soc. Philom. 2: 140. 1800; Hsia in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping 1: 68. 1931; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 19: 33. 1966.

植株高大，叶边缘细尖锯齿，头状花序大，直径达7厘米。早年，北京和陕西武功曾有栽培。

98. 短舌菊属—*Brachanthemum* DC.

DC., Prodr. 6: 44. 1837.—*Chrysanthemum* sect. *Argyranthemum* (Webb ex Sch.-Bip.) Benth. et Hook. f., Gen. Pl. 2: 426. 1876, p. p.; O. Hoffm. in Engl. et Prantl. Pflanzenfam. 4(5); 278. 1889. *Chrysanthemum* sect. *Argyranthemum* subsect. *Brachanthemum* (DC.) Ling in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping 3: 476. 1935.

小半灌木，被单毛、叉状分枝的毛或星状毛。叶互生或几成对生，羽状或掌状或掌式羽状分裂。头状花序异型，单生顶端，或少数或多数排成疏散或紧密的伞房花序。边花雌性，舌状，1—15个，极少无舌状花而边缘雌花成管状的。中央盘花两性管状。总苞钟状、半球形或倒圆锥状。总苞片4—5层，硬革质，边缘光亮或褐色膜质。花托突起，钝圆锥状，无托毛，或花托平而有短托毛。舌状花黄色，少白色；舌片卵形或椭圆形，长1.2—8毫米。管状花黄色，顶端5齿裂。花柱分枝线形，顶端截形。全部瘦果同形，圆柱形，基部收窄，有5条脉纹。无冠状冠毛。

全属约7种，分布亚洲中部。生草原及半荒漠地区。我国约有5种。

属模式种：*Brachanthemum fruticosum* (Ledeb.) DC.

分 种 检 索 表

1. 植株被单毛或叉状分枝的毛。叶裂片线状钻形，顶端急尖……1. 蒙古短舌菊 *B. mongolicum* Krasch.
1. 植株被贴伏的尘状星状毛。叶裂片线形……… 2. 星毛短舌菊 *B. pulvinatum* (Hand.-Mazz.) Shih

1. 蒙古短舌菊

***Brachanthemum mongolicum* Krasch.** in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad.