

18. 海州蒿 (植物研究) 苏北碱蒿、矮青蒿(江苏北部) 图版 4:9—15

Artemisia fauriei Nakai in Bot. Mag. Tokyo **29**:7. 1915. quoad pl. Faurie 361.

Type! Paris Mus. Herb. —— *A. fukudo* Makino var. *mokpensis* Pamp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n.s. **34**:656. 1927. —— *A. nakai* Pamp. l.c. **34**:682. 1927. p.p. —— *A. haichowensis* Chang in Bull. Fan Mém. Inst. Biol. **7**:158. 1936; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **18**(1—2): 135. 1965; Y. R. Ling in Bull. Bot. Res. **2**(2):36. 1982.


多年生草本。主根单一, 垂直, 狹纺锤形; 根茎稍粗短, 直立, 直径 0.5—1.5(—2) 厘米, 偶有营养枝。茎单一, 稀少数, 高 20—60 厘米, 紫褐色或淡褐色, 有纵棱; 分枝多, 斜上展; 茎、枝初时被灰白色蛛丝状绒毛, 后脱落。叶稍肉质, 初时被蛛丝状绒毛, 后无毛, 基生叶密集着生, 卵形或宽卵形, 长 11—18 厘米, 宽 8—16 厘米, 三(至四)回羽状全裂, 小裂片狭线形, 长 (1—)1.5—3 厘米, 宽 0.5—1.5 毫米, 先端稍钝尖, 叶柄长 5—13 厘米, 花期叶萎谢; 下部与中部叶宽卵形, 长、宽 3—5 厘米, 二(至三)回羽状全裂, 每侧有裂片 3—4 枚, 裂片间隔疏离, 小裂片狭线形, 长 0.5—1.5 厘米, 宽 0.5—1.5 毫米, 先端钝尖, 叶柄长 0.8—1.2 厘米, 基部略宽, 半抱茎; 上部叶、苞片叶与小枝上的叶倒卵形, 3—5 全裂或不分裂, 裂片或不分裂之苞片叶狭线形, 长 1—3 厘米, 无柄, 基部有假托叶。头状花序卵球形或卵球状倒圆锥形, 直径 2—3(—4) 毫米, 多数, 下垂, 具短梗或近无梗, 有细小的小苞叶, 在分枝上排成复总状花序, 并在茎上组成略开展或狭长的圆锥花序; 总苞片 3—4 层, 外层、中层总苞片卵形或长卵形, 初时背面微被蛛丝状绒毛, 后近无毛, 具绿色中肋及膜质边缘, 内层总苞片长卵形, 半膜质; 花序托凸起, 有白色托毛; 雌花 2—5 朵, 花冠狭管状, 外面密被腺体, 檐部具 2—3 裂齿, 花柱伸出花冠外, 先端 2 叉, 叉端钝尖; 两性花 8—15 朵, 花冠管状, 背面下部有腺点; 花药线形, 先端附属物尖, 长三角形, 基部钝, 花柱与花冠近等长, 先端稍叉开, 叉端截形。瘦果倒卵形, 稍压扁。花果期 8—10 月。

产河北、山东、江苏三省沿海地区的滩涂或沟边。朝鲜、日本也有。模式标本采自朝鲜。

作者查阅了 *A. fauriei* Nakai 的模式标本(Faurie 361, 存巴黎自然博物馆标本馆)与 *A. haichowensis* Chang 的模式标本(T.P. Chang 757, 存中国科学院华南植物研究所), 发现二者体态、叶形及头状花序结构等无甚差别, 故将后者归并于前者中作为晚出的异名。

19. 矮滨蒿 (东北植物检索表)

Artemisia nakai Pamp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n.s. **34**: 682. 1927; Kitam. in Mem. Coll. Sci. Kyoto Univ. ser. B. **15**(3):434. 1940 et in Trans. Sapp. Nat. Hist. Soc. **16**: 60. 1940; 东北植物检索表 394, 图版 136, 图 4. 1959; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **18**(3—4): 246. 1965. —— *A. fauriei* Nakai in Bot. Mag. Tokyo **29**: 7. 1915. p.p. et Fl. Sylv. Kor. **14**:100. 1923. p.p.; Kitam. in Act. Phytotax. Geobot. **5**: 91. 1936. —— *A. fukudo* Makino var. *mokpensis* Pamp. l.c. **34**: 缘褐色, 膜质, 内层总苞片椭圆形或倒卵状椭圆形, 半膜质或膜质; 花序托具托毛; 雌花



1—8. 冻原白蒿 *Artemisia stracheyi* Hook.f. et Thoms. ex C. B. Clarke: 1. 植株一部分, 2. 头状花序, 3. 总苞片, 4. 雌花, 5. 雌花的花柱与柱头, 6. 两性花, 7. 两性花纵切, 示雄蕊着生方式, 8. 两性花的花柱与柱头。9—15. 海州蒿 *A. fauriei* Nakai: 9. 植株一部分, 10. 基生叶一部分, 11. 雌花, 12. 雄花的花柱与柱头, 13. 两性花, 14. 两性花的花柱与柱头, 15. 花托, 示托毛。(余 峰绘)