

全草入药,有温经、去湿、散寒、止血、消炎、平喘、止咳、安胎、抗过敏等作用。历代医籍记载为“止血要药”,又是妇科常用药之一,治虚寒性的妇科疾病尤佳,又治老年慢性支气管炎与哮喘,煮水洗浴时可防治产褥期母婴感染疾病,或制药枕头、药背心,防治老年慢性支气管炎或哮喘及虚寒胃痛等;艾叶晒干捣碎得“艾绒”,制艾条供艾灸用,又可作“印泥”的原料。此外全草作杀虫的农药或熏烟作房间消毒、杀虫药。嫩芽及幼苗作蔬菜。

56b. **朝鲜艾** (变种) 朝鲜艾蒿(东北植物检索表),野艾(内蒙古植物志),深裂叶艾蒿(俗称)

var. **gracilis** Pamp. l.c. **36**: 453, fig. 83. 1930; 东北植物检索表 390. 1959; S. Y. Hu l. c. **18**(1—2): 124. 1965. — *A. chiarugii* Pamp. l. c. **36**: 486. 1930; Kitag. Lineam. Fl. Mansh. 424. 1939; Kitam. in Act. Phytotax. Geobot. **12**: 154. 1943; S. Y. Hu l. c. **18**(1—2): 129. 1965; Noda, Fl. N.-E. Prov. (Mansh.) China 1211. 1971.

与原变种区别在于本变种茎中部叶为羽状深裂。

分布区与用途同原变种。

57. **湘赣艾** (植物研究)

Artemisia gilvescens Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. **2**: 175. 1866; Pamp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n. s. **36**: 466. 489. 1930, incl. var. *typica* Pamp.; Kitam. in Act. Phytotax. Geobot. **5**: 90. 1936, in Mém. Coll. Sci. Kyoto Univ. ser. B. **15** (3): 413. 1940 et in Journ. Jap. Bot. **20**: 193. 1944; Ohwi, Fl. Jap. 1194. 1956; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **18**(1—2): 134. 1965. — *A. vulgaris* Linn. var. *latifolia* auct., non Bess.: Takeda in Bot. Mag. Tokyo **25**: 23. 1911. p.p. — *A. vulgaris* Linn. var. *gilvescens* (Miq.) Nakai in Bot. Mag. Tokyo **26**: 102. 1912. p.p.

多年生草本。根细,侧根多;根状茎稍粗短,直立或稍匍地。茎单生,稀少数,高 80—150 厘米,有纵棱;上半部分枝,枝长 10—15 厘米,上展,茎、枝密被灰褐色或灰棕褐色绵毛。叶厚纸质,上面绿色,密被白色腺点,并疏被灰白色蛛丝状绵毛或近无毛,背面密被蛛丝状绵毛;下部叶卵形,长 9—11 厘米,宽 8—9 厘米,羽状浅裂或深裂,花期萎谢;中部叶长圆形或卵状椭圆形,长 6—7(—10) 厘米,宽 2.8—4.5(—6) 厘米,通常 3 深裂,稀 5 裂,中央裂片椭圆形,先端尖,两侧裂片椭圆状披针形,先端钝,裂片长 3—4 厘米,宽 1—1.5 厘米,全缘或有 1—2 枚粗锯齿或浅裂齿,叶基部楔形,渐狭,无假托叶;上部叶椭圆形,不分裂,先端钝尖,边缘稍反卷,基部渐狭。头状花序长圆球形,具短梗或无梗,直径 2.5—3 毫米,在分枝上排成总状或穗状花序,并在茎上组成开展的圆锥花序;总苞片 3—4 层,外层较短小,卵形,背面被灰白色蛛丝状绵毛,边缘膜质,中层总苞片椭圆形,背面被灰白色蛛丝状毛,边宽膜质,内层总苞片长圆形或长椭圆形,先端圆钝,半膜质,无毛或近无毛,花