

热带地区的广布种,朝鲜、日本、越南、老挝、柬埔寨、马来西亚、泰国、印度尼西亚、印度、尼泊尔、斯里兰卡以及小亚细亚、欧洲中部以南至非洲北部及东部国家都有。模式标本采自意大利。

入药,作“艾”(家艾)的代用品,有消炎、止血作用。

61. 狭裂白蒿(植物研究) 白蒿(甘肃),“康拉巴”(青海藏语与土族语名) 图版 12: 9—17

*Artemisia kanashiroi* Kitam. in Act. Phytotax. Geobot. 12: 147 1943.


多年生草本。主根细长,侧根多;根状茎常匍地延伸。茎单生或少数,高 25—60 厘米,具细纵棱;上部分枝长 2—3(—5) 厘米,下部枝长 8—15(—20) 厘米;茎、枝初时密被灰白色或灰黄色蛛丝状绒毛,后茎下部毛渐脱落,上部毛稍稀疏。叶纸质,上面绿色,疏被灰白色短柔毛及白色腺点,背面密被灰白色蛛丝状厚绒毛;基生叶与茎下部叶近圆形或宽卵形,长 3—4(—4.5) 厘米,宽 3—4 厘米,一至二回羽状分裂,第一回全裂,每侧有裂片 2—3 枚,裂片椭圆形,长 1.5—2.5 厘米,宽 3—8 毫米,第二回为深裂或全裂,每侧具小裂片 1—2 枚,小裂片狭线形或线形,长 0.3—1 厘米,宽 1—2.5 毫米,先端钝尖,叶柄长 3—4 厘米;中部叶近圆形或宽卵形,长、宽 3—4 厘米,一(至二)回羽状全裂,每侧裂片(1—)2—3 枚,裂片线形或狭线形,稀为线状披针形,长 1—2(—4) 厘米,宽 1—2(—4) 毫米,先端尖,边常外卷,叶柄长 0.5—3 厘米;上部叶 3—5 全裂,无柄;苞片叶 3 全裂或不分裂,裂片或不分裂的苞片叶线形或狭线形。头状花序长圆形或长卵形,直径 2—2.5(—3) 毫米,无梗,具小苞叶,在分枝或分枝的小枝上排成短穗状花序,而在茎上组成略狭而长的圆锥花序或为中等开展的圆锥花序;总苞片 3—4 层,外层略短小,外层、中层总苞片卵形、长卵形,背面密被灰白色蛛丝状厚绒毛,边狭膜质,内层总苞片卵形,背面毛略少,边宽膜质;雌花 3—6 朵,花冠狭管状,檐部具 2 裂齿,花柱长,伸出花冠外,先端 2 叉,叉端钝尖;两性花 6—10 朵,花冠管状,檐部紫色,花药线形,先端附属物尖,长三角形,基部钝,花柱近与花冠等长,先端 2 叉,叉端截形,具睫毛。瘦果长圆形或长圆状倒卵形。花果期 8—10 月。

产内蒙古(南部)、河北(西部)、山西、陕西(北部)、宁夏(南部)、甘肃(东部)及青海(固原)等省区;生于海拔 2 300 米以下地区的田边、路旁、山坡等处。模式标本采自山西太原。

62. 中甸艾(植物研究) 缅甸艾(植物研究)

*Artemisia zhongdianensis* Y. R. Ling in Bull. Bot. Res. 8(3):1, Tab. 1:1—8. 1988. — *A. burmanica* auct., non Pamp.: Y. R. Ling in Bull. Bot. Res. 4(2): 20, fig. 4. 1—9. 1984.

多年生草本。高 80—100 厘米或更长,紫褐色或淡褐色,纵棱明显,分枝多,开展,枝长 10—20 厘米或更长;茎、枝被平贴的、短柔毛。叶纸质,上面密被白色腺点及小凹穴,并被稀疏平贴的短柔毛,腺点易脱落,叶背密被灰白色微成蛛丝状的短柔毛及稀疏白色腺点;茎下部叶花期凋谢;中部叶宽卵形或卵形,长 6—8 厘米,宽 5—8 厘米,二(至三)回羽



1—8. 野艾蒿 *Artemisia lavandulaefolia* DC.: 1. 植株一部分, 2. 中部叶, 3. 叶一部分放大, 示叶面具腺点, 4. 头状花序, 5—6. 外、中层总苞片, 7. 雌花, 8. 两性花。9—17. 狭裂白蒿 *A. kanashiroi* Kitam.: 9. 植株一部分, 10. 中部叶, 11. 叶一部分放大, 示叶面具腺点, 12. 头状花序, 13—15. 外、中、内层总苞片, 16. 雌花, 17. 两性花。(邓晶发绘)