

无锯齿,叶基部渐狭,楔形。头状花序直径2—2.5毫米,在分枝上排成密穗状花序,并在茎上组成狭长的圆锥花序。

我国有1种,1变种。

105. 萎蒿(食疗本草) 萎(诗经), 藁、蒿萎、由胡(尔雅), 白蒿【本草纲目(水生者)】, 闾蒿(救荒本草), 柳叶蒿(东北植物检索表), 狭叶艾(江苏南部种子植物手册), 三叉叶蒿(吉林), 高茎蒿(河北), 水蒿(内蒙古、河北), 水艾、小蒿子(江苏), 芦蒿、香艾、刘寄奴、红陈艾(四川), 水陈艾、红艾(四川、云南), “奥存-沙里尔日”(蒙语名)

Artemisia selengensis Turcz. ex Bess. in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. 3:50. 1834; DC. Prodr. 6:112. 1837; Ledeb. Fl. Ross. 2(2): 584. 1844—1846; Nakai, Fl. Kor. 2:32. 1911 et Fl. Sylv. Kor. 14:102. 1913, incl. f. *simplicifolia* Nakai; Pamp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n.s. 36: 473. 1930, incl. var. *typica* Pamp. cum f. *genuina* Pamp., f. *serratifolia* Pamp. et f. *amurensis* Pamp., var. *pannosa* Pamp. et var. *cannabifolia* Pamp., incl. f. *genuina* Pamp., f. *dielsii* Pamp., f. *subintegra* Pamp., f. *integerrima* Pamp. et f. *simplicifolia* Pamp.; Komar. et Alis. Key Pl. Far East. Reg. USSR 2: 1041. 1932; Ling in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peip. 2(10): 522. 1934; Kitag. Lineam. Fl. Mansh. 432. 1939, incl. f. *integerrima* (Komar.) Kitag.; Kitam. in Mem. Coll. Sci. Kyoto Univ. ser. B. 15(3): 416. 1940; 东北植物检索表 390, 图版 133, 图 10. 1959; 江苏南部种子植物手册 785, 图 1267. 1959; Poljak. Фл. СССР. 26: 454. 1961; S.Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 18(3—4): 257. 1965; Noda, Fl. N.-E. Prov. (Manch.) China 1222. 1971; 中国高等植物图鉴 4: 540, 图 6493. 1975; Lauen. in Not. Bot. Gard. Edinb. 34(3): 355. 1976; 江苏植物志下: 874, 图 2197. 1982. — *A. vulgaris* Linn. lus. *selengensis* Regel et lus. *serratifolia* Regel, Tent. Fl. Ussur. 96. 1861. — *A. vulgaris* Linn. var. *selegensis* (Turcz. ex Bess.) Maxim. in Bull. Acad. Sci. Pétersb. 8:536. 1872; Komar. Fl. Mansh. 3:640. 1907, incl. f. — *A. vulgaris* Linn. var. *integerrima* Komar. l.c. 3:640. 1907. — *A. cannabifolia* Lévl. in Fedde, Rep. Sp. Nov. 12:284. 1913, Cat. Pl. Yunnan 38. 1915 et Fl. Kouy-Tchéou 84. 1914, incl. var. *nigrescens* Lévl.; Nakai in Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo 31:113. 1952, pro syn. sub. *A. selengensis* Turcz. ex Bess. var. *integerrima* (Komar.) Nakai.

105a. 萎蒿(原变种) 图版 19: 8—15

var. *selengensis*

多年生草本;植株具清香气味。主根不明显或稍明显,具多数侧根与纤维状须根;根状茎稍粗,直立或斜向上,直径4—10毫米,有匍匐地下茎。茎少数或单一,高60—150厘米,初时绿褐色,后为紫红色,无毛,有明显纵棱,下部通常半木质化,上部有着生头状花序