

产四川西部（峨眉山、天全、宝兴及峨边等）。生于海拔 950—2 200 米的岩石边或潮湿处。模式采自四川峨眉山。

此种与上种显然近缘，区别在于具卵形渐尖及边缘深波状齿的叶，以及 4—7 头状花序排成近伞形状伞房花序。

15. 海南蒲儿根 海南千里光（海南植物志）

Sinosenecio hainanensis (Chang et Tseng) C. Jeffrey et Y. L. Chen in Kew Bull. **39** (2): 238. 1984. — *Senecio hainanensis* Chang et Tseng, 海南植物志 **3**: 585. 1974.

多年生葶状草本。根状茎粗壮，直径达 6 毫米，稍木质；茎直立，单生，或 2—3 个，高 15—30 厘米，不分枝，幼时被白色蛛丝状绒毛，后变无毛；叶数个，基生，莲座状，具长柄；叶片卵形，卵状长圆形或倒卵形，长 6—12 厘米，宽 4—8 厘米，顶端近圆形，基部圆形至宽楔形，有时不等侧，边缘具线波状齿，齿端具小尖，两面初时被密白色绒毛，或后多少脱毛至无毛，或被疏短柔毛；羽状脉，具侧脉 6—7 对；中脉在下面明显凸起；叶柄较粗壮，长 5—10 厘米，被疏蛛丝状绒毛。头状花序单生于茎端，直径 2 厘米；花葶无苞片。总苞钟状半球形，长 6 毫米，宽 7 毫米，无外层小苞片；花托近无毛；总苞片草质，约 13，1 层，披针形，宽 1—1.5 毫米，顶端渐尖，边缘干膜质，外面被短柔毛。舌状花 9—10 个，管部长 3 毫米，舌片黄色，椭圆状长圆形，长 8—10 毫米，宽 3—4 毫米，顶端渐尖，具 2 细齿，具 7 条脉；管状花多数，花冠黄色，长 3.5 毫米，管部长 1.5—2 毫米，檐部钟状，裂片长圆状披针形，长 2 毫米，顶端尖；花药长圆形，基部钝至圆形，附片卵形；花柱分枝外弯，顶端截形，两侧被乳头状微毛。瘦果倒卵状椭圆形，长约 3.5 毫米，无毛，具肋，无冠毛。花期 7—10 月。

产海南（保亭、黎母岭）。生于山坡阳处或林中，海拔 900—1 200 米。模式采自海南黎母岭。

本种为海南特有，同时也是本属中分布最南部的一个种。叶卵形至倒卵形，具羽状脉，在本属中至为特殊。但由于具花葶，花药内壁细胞壁增厚明显两极排列以及瘦果肿胀且无冠毛，故仍然属于本属。

系 2. 茎叶系 Ser. Elati C. Jeffrey et Y. L. Chen in Kew Bull. **39** (2): 239. 1984.

系模式：秃果蒲儿根 *S. phalacrocarpus* (Hance) B. Nord.

16. 匍枝蒲儿根 图版 28: 8—15

Sinosenecio globigerus (Chang) B. Nord. in Opera Bot. **44**: 50. 1978; C. Jeffrey et Y. L. Chen in Kew Bull. **39** (2): 239. 1984. — *Senecio globigerus* Chang in Sunyatsenia, **6**: 21. 1941; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **21**: 47. 1968; 中