

本种植株矮小，叶较小，叶片近圆形或五角形，几不裂，上面被白色绒毛，与前种不难区别。

### 25. 松潘蒲儿根

*Sinosenecio sungpanensis* (Hand.-Mazz.) B. Nord. in Opera Bot. 44: 51. 1978; C. Jeffrey et Y. L. Chen in Kew Bull. 39 (2): 248. 1984; 横断山区维管植物下册: 2088. 1994. — *Senecio sungpanensis* Hand.-Mazz. in Anzeig. Akad. Wiss. Wien 62: 149. 1925, et Symb. Sin. 7: 1123. 1936, et in Acta Hort. Gothob. 12: 290. 1938; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 21: 147. 1968.

具匍匐枝茎叶草本。根状茎径6—8毫米，覆盖以褐色宿存残叶柄。茎单生，直立，高达40—50厘米，基部径5—6毫米，不分枝，下部紫色，初时被疏白色蛛丝状绒毛，后多少脱毛。基部叶花期凋萎；下部茎叶具长柄，叶片肾形，长3—3.5厘米，宽4—4.5厘米，掌状5—7浅裂，裂片卵状三角形，通常具数个细齿，顶端具小尖，基部心形，或有时近截形，上面绿色，被疏短柔毛至近无毛，下面被密白色绒毛；叶柄长6—7厘米，被疏白色蛛丝状毛，基部扩大；上部茎叶与中部叶同形，但较小，具短柄；最上部叶披针形，边缘具细齿或全缘。头状花序径2—2.5厘米，通常4—5个排列成顶生近伞形状伞房花序；花序梗长2—5厘米，被疏蛛丝状毛，基部具苞片，或有时中部具1钻形苞片。总苞半球形，长约10毫米，宽7—10毫米，无外层苞片；总苞片草质，1层，15—17个，长圆状椭圆形，宽2—2.5毫米，顶端尖，紫红色，上部边缘被缘毛，外面被疏长柔毛或变无毛。舌状花12—13，管部长4.5—5毫米，无毛，舌片黄色，长圆形，长9毫米，宽2毫米，顶端具3细齿；管状花多数，花冠黄色，长6.5—7毫米，管部长3.8毫米，檐部钟状；裂片披针形，长1.5毫米，顶端尖；花药长圆形，长1.5毫米，基部钝，附片披针形；花柱分枝外弯，长约1毫米，顶端截形，被乳头状微毛。瘦果圆柱形，长1.8毫米，无毛，具肋；冠毛白色，长6毫米。花期7月。

产四川西北部（松潘、金汤）。生于海拔4 000—4 280米的高山草地。模式采自松潘。

### 26. 植夫蒲儿根

*Sinosenecio fangianus* Y. L. Chen in Acta Phytotax. Sin. 26 (1): 52. fig. 3. 1988; 横断山区维管植物下册: 2088. 1993.

多年生草本。具匍匐枝；根状茎短，直径4—5毫米，有多数纤维状根。茎直立，高30—60厘米，不分枝，被疏白色柔毛。基生叶在花期枯萎，具叶柄；叶片肾形，长3—6厘米，宽3—7厘米，掌状中裂，裂片7—9，卵状长圆形，长1.5—2.5厘米，宽1—2厘米，全缘或有时具2—3个小齿，基部深心形，上面绿色，无毛或被疏短柔毛，下面被白色蛛丝状毛或短柔，边缘有缘毛，具5条掌状脉；叶脉在两面凸起；中部和上部茎生叶与下部叶同形，但较小；下部的叶柄长3—7厘米，基部不扩大，被疏短柔毛；