

种容易识别。

6. 江浙狗舌草 图版 34: 1—6


Tephrosieris pierotii (Miq.) Holub in Folia Geobot. et Phytotax. **8**: 174. 1973; C. Jeffrey et Y. L. Chen in Kew Bull. **39** (2): 273. 1984. — *Senecio pierotii* Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. -Bat. **2**: 182. 1866; Hara in Journ. Jap. Bot. **9**: 859. 1935; Kitam. in Acta Phytotax. Geobot. **6**: 272. 1937, et in Mem. Coll. Sc. Kyoto Univ. ser. B **16**: 242. 1942; Ohwi, Fl. Jap. 887. 1965. — *Senecio subdentatus* (Bge.) Turcz. var. *pierotii* (Miq.) Cuf. in Repert. Sp. Nov. Beih. **70**: 82. 1933. — *Senecio campestris* (Retz.) DC. var. *subdentatus* auct. non (Bge.) Maxim.; Franch. et Sav., Enum. Pl. Jap. 252. 1875.

根状茎草本。茎单生，直立，高 50—60 厘米，较粗壮，不分枝，被蛛丝状毛，或多少脱毛。基生叶数个，莲座状，具长柄，在花期通常生存，长圆形，狭长圆形或披针形，长 12—20 厘米，宽 1.5—3 厘米，顶端钝至稍尖，基部楔形，或渐狭成叶柄，边缘具有小尖头齿，或有时近全缘，纸质，初时两面被白色蛛丝状绒毛，或后多少脱毛；羽状脉；叶柄长 4—11 厘米，或多或少具翅，初时被蛛丝状绒毛，基部扩大；茎叶较多数，无柄，下部叶长圆至披针形，基部半抱茎，上部茎叶渐小，披针形至线形，渐尖，基部宽半抱茎，最上部叶苞片状，线形或线状钻形，急尖，被白色蛛丝状绒毛。头状花序径 2.5—3 厘米，通常 6—30，排成顶生近伞形状或伞形状伞房花序；花序梗长达 5 厘米，被疏蛛丝状毛或柔毛，基部具线状钻形苞片。总苞半球形，长 7—8.5 毫米，宽 10—14 毫米，无外苞片；总苞片 20—22，宽披针形，宽 1 毫米，顶端渐尖，草质，边缘膜质，外面被疏蛛丝状毛或变无毛。舌状花 20—25，管部长 4—6 毫米，舌片黄色，长圆形，长 7—8 毫米，宽 2—2.5 毫米，顶端钝，具 3 细齿，具 4 脉；管状花多数，花冠黄色，长 7—9 毫米，管部长 5—6 毫米，檐部漏斗状；裂片卵状长圆形，长 1—1.2 毫米，尖，顶端具乳头状毛。花药长 1.5 毫米，基部钝；花柱分枝长 1 毫米，顶端截形、被乳头状微毛。瘦果圆柱形，长 2.5—3 毫米，无毛；冠毛白色，长 7—9 毫米。花期 4—5 月。

产江苏（天平山、紫金山、苏州）、浙江（宁波、龙泉）、福建（古田、沙县）。生于沼泽、潮湿处。模式采自日本。日本及朝鲜也有分布。

7. 台东狗舌草

Tephrosieris taiwoensis (Hayata) Holub in Folia Geobot. et Phytotax. **8**: 174. 1973; C. Jeffrey et Y. L. Chen in Kew Bull. **39** (2): 274. 1984. — *Senecio gaitoensis* Hayata in Journ. Coll. Sc. Univ. Tokyo **30**: 156. 1911, et Icon. Pl. Formos. **8**: 1919; Kitam. in Acta Phytotax. Geobot. **6**: 272. 1937, et in Mem. Coll. Sc. Kyoto Univ. Ser. B. **16**: 243. 1942; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **21**: 147.



图版34 1—6. 江浙狗舌草 *Tephroseris pierotii* (Miq.) Holub: 1. 植株; 2. 总苞片; 3. 舌状花; 4. 管状花; 5. 花药; 6. 花柱分枝。7—14. 湿生狗舌草 *T. palustris* (L.) Four.: 7. 植株; 8, 9. 总苞片; 10. 舌状花; 11. 管状花; 12. 花药; 13. 花柱分枝。(冀朝祯绘)