

36. 牛蒡叶橐吾(中国高等植物图鉴) 大马蹄香、大独叶草(云南)

Ligularia lapathifolia (Franch.) Hand.-Mazz. in Vegetationsbild. 22: Heft. 8. t. 45a. 1932, in obs., Symb. Sin. 7: 1133. 1936 et in Bot. Jahrb. 69: 107. 1938; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 20: 64. 1967; Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. 34: 370. 1976; 中国高等植物图鉴 4: 581. 图 6575. 1975. — *Senecio lapathifolius* Franch. in Bull. Soc. Bot. France 39: 306. 1892. — *S. tongtchuanensis* Lévl. in Bull. Acad. Géogr. Bot. 25: 17. 1915 et Cat. Pl. Yunnan 59. 1916. — *Senecillis lapathifolia* (Franch.) Kitam. in Acta Phytotax. Geobot. 8: 86. 1939.

多年生草本。根肉质,多数,粗而长,直径约5毫米。茎直立,高达120厘米,上部连同花序被白色蛛丝状柔毛和有节短柔毛或老时脱毛,下面光滑,条棱明显,基部直径0.8—1.5厘米,被枯叶柄纤维包围。丛生叶和茎下部叶具柄,柄长7—25厘米,被白色蛛丝状柔毛,基部具鞘,叶片卵形或卵状长圆形,长19.5—40.5厘米,宽8.5—23厘米,先端钝,边缘有整齐的小齿,齿端具软骨质小尖头,齿间有睫毛,基部截形或稍楔形,两面被疏的白色蛛丝状毛或脱毛,叶脉羽状,中脉粗,宽达1.2厘米,侧脉开展;茎中上部叶向上渐小,无柄,鞘状抱茎,叶片卵状长圆形或卵状披针形,长达20厘米,宽至9厘米。伞房状花序分枝长达23厘米,开展或近丛生;苞片和小苞片线状钻形,极小;花序梗长0.5—4厘米;头状花序辐射状,通常6—23,稀较多,总苞半球形或宽钟形,长10—12毫米,宽达20毫米,总苞片8—14,2层,近革质,卵状披针形或披针形,宽至7毫米,先端急尖,有小尖头,常弯曲,背部被白色蛛丝状柔毛,内层边缘宽膜质。舌状花黄色,舌片线状长圆形,长15—20毫米,宽3—4毫米,先端急尖,管部长约7毫米;管状花多数,长10—11毫米,管部长约5毫米,檐部渐狭,冠毛红褐色或淡黄红色,与花冠等长。瘦果长圆形,长4—7毫米,褐色,先端略狭缩,基部圆形,光滑,具肋或否。 花果期7—10月。

产云南西北部、四川西南部。生于海拔1800—3000米的草坡、林下及灌丛中。模式标本采自云南鹤庆(大坪子)。

大马蹄香一名曾用于千崖子橐吾 *Ligularia kanaitzensis* (Franch.) Hand.-Mazz. (中国经济植物志,下册 1503, 1961),但其描述疑即本种。未见所依据的标本,待查。

37. 广叶橐吾

Ligularia euryphylla (C. Winkl.) Hand.-Mazz. in Bot. Jahrb. 69: 108. 1938; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 20: 58. 1967. — *Senecio euryphyllus* C. Winkl. in Acta Hort. Petrop. 14: 156. 1895; Limpr. in Fedde, Rep. Sp. Nov. Beih. 12: 508. 1922. — *Senecillis euryphylla* (C. Winkl.) Kitam. in Acta Phytotax. Geobot. 8: 87. 1939.

多年生草本。茎直立,高达100厘米,上部被白色蛛丝状柔毛,下部光滑,基部被枯叶柄纤维包围。丛生叶和茎下部叶具柄,柄长30—40厘米,常有翅,基部有鞘,叶片心状披