

米,糙毛状。 花果期 8 月。

模式标本采自西藏昂仁县。生于山谷或河边砾石地,海拔 4400—4500 米。仅见昂仁地区有分布。

5. 川木香(植物分类学报) 木香

Dolomiaea souliei (Franch.) Shih 植物分类学报 **24**(4):294, 1986——*Jurinea souliei* Franch. in Journ. de Bot. **8**: 377, 1894; Hand. -Mazz. in Act. Hort. Gothob. **12**: 345, 1938; S. S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **22** (1—2): 9, 1967——*Vladimiria souliei* (Franch.) Ling in Act. Phytotax. Sin. **10**: 79, 1965; 中国高等植物图鉴 **4**: 644, 1975。

川木香(原变种)

var. *souliei*

多年生无茎或几无茎莲座状草本。根粗壮,直径 1.5 厘米,直伸。全部叶基生,莲座状,全形椭圆形,长椭圆形,披针形或倒披针形,长 10—30 厘米,宽 5—13 厘米,质地厚,羽状半裂,有长 2—6(16) 厘米的宽扁叶柄,两面同色,绿色或下面色淡,两面被稀疏的糙伏毛及黄色小腺点,下面沿脉常有较多的蛛密毛,中脉在叶下面高起,叶柄两面被稠密的蛛丝状绒毛及硬糙毛和黄色腺点;侧裂片 4—6 对,斜三角形或宽披针形,长 2—5 厘米,宽 2—3 厘米,顶裂片与侧裂同形,但较小,全部裂片边缘刺齿或齿裂,齿裂顶端有短针刺。或叶不裂,边缘锯齿或刺尖或不规则的犬齿状浅裂。头状花序 6—8 个集生于茎基顶端的莲座状叶丛中。总苞宽钟状,直径 6 厘米。总苞片 6 层,外层卵形或卵状椭圆形,长 2—2.5 厘米,宽约 1 厘米;中层偏斜椭圆形或披针形,长约 3 厘米,宽 0.6—1.1 厘米;内层长披针形,长 3.5 厘米,宽 0.5 厘米。全部苞片质地坚硬,先端尾状渐尖成针刺状,边缘有稀疏的缘毛。小花红色,花冠长 4 厘米,檐部长 1 厘米,5 裂,花冠裂片长 6 毫米,细管部长 3 厘米。瘦果圆柱状,稍扁,长 7—8 毫米,顶端有果缘。冠毛黄褐色,多层,等长,长 3 厘米,外层向下皱曲反折包围并紧贴瘦果,内层直立,不向下皱曲反折;全部冠毛刚毛短羽毛状或糙毛状,基部粗扁,向顶端渐细。 花果期 7—10 月。

分布四川西部(康定新都桥、大金)、西藏东部(昌都、盐井、芒康、江达)。生于高山草地及灌丛中,海拔 3700—3800 米。模式标本采自四川康定新都桥。

根入药,性味辛、苦,温。行气止痛,和胃止泻。

灰毛川木香(植物分类学报) 木里木香

var. *mirabilis* (Anth.) Shih, 植物分类学报 **24**(4):294, 1986——*Jurinea mirabilis* Anth. in Not. Bot. Gard. Edinb. **18**: 22, 1933——*J. trachyloma* Hand.-Mazz. in Not. Bot. Gart. Berlin **13**: 658, 1937; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **20** (1—2): 9, 1967——*J. muliensis* Hand. -Mazz., l. c. 659; S. Y. Hu, l. c.——*Vladimiria trachyloma* (Hand.-Mazz.) Ling in Act. Phytotax. Sin. **10**: 80, 1965——*V. muliensis* (Hand.-Mazz.)