

不是 *C. crispus* L.。

应该指出,在这两种飞廉植物的共同分布区内,出现杂交是经常可能的。由于二者之间基因交流可能经常出现,使其二者本来微弱的区别常为消失。因此,将二者合并为一个种的倾向是存在的。

168. 寡毛菊属——*Oligochaeta* C. Koch

C. Koch in *Linnaea* **17**: 42, 1843; *Czer.* in *Фл. Туркм.* **7**: 259, 1960 et in *Fl. URSS* **28**: 346, 1963——*Serratula* sect. *Oligochaeta* (*C. Koch*) *DC.*, *Prodr.* **6**: 671, 1837——*Microlonchus* auct. non *Cass.*: *Boiss.*, *Fl. Or.* **3**: 700, 1875, p. p.——*Centaurea* sect. *Microlonchus* (*Cass.*) *O. Hoffm.* in *Engler.*, *Pflanzenfamam.* **4**(5): 329, 1893, p. p.——*Cousinia* subgen. *Oligochaeta* (*C. Koch*) *C. Winkl.* in *Act. Hort. Petrop.* **14**: 188, 217, 1898.

一年生草本,分枝开展,全部茎枝有蛛丝毛或几无毛。叶不分裂或大头羽状分裂。头状花序同型,含少数小花,少数,生枝端或腋生。总苞椭圆形或椭圆状卵形,被蛛丝毛。总苞片多层,覆瓦状排列,绿色或黄绿色,有不明显的细脉纹,外层三角形,长椭圆形,内层披针形或线状披针形,顶端有针刺,针刺开展或外倾或反折。花托有托毛。全部小花两性,管状,花冠粉红色,无毛。花药基部附属物小。花丝扁平,有乳突状毛。花柱中部有毛环,花柱分枝开展,伸出花药管之上。瘦果椭圆形、长椭圆形或倒披针状,顶端截形,有果缘,果缘边缘全缘或有微齿,有时边花瘦果不明显4棱形,全部瘦果基底着生面。冠毛白色,与瘦果等长或长于瘦果,2列,外列两层,内层渐长,毛状,边缘锯齿状一糙毛状,基部连合成环,通常有1—2根超长的冠毛刚毛,内列冠毛1层,短,3—5个,膜片状。

约3种,分布苏联中亚、高加索地区。我国新疆地区有1种。

属模式种: *O. divaricata* (*Fisch. et Mey.*) *C. Koch*

1. 寡毛菊(中国高等植物图鉴) 图版3: 9; 6: 5(1—3); 35: 3

Oligochaeta minima (*Boiss.*) *Briq.* in *Archiv. Sc. Phys. et Nat. Geneve*, **5**, **12**: 113, 1930; *Czer.* in *Фл. Туркм.* **7**: 260, 1960 et in *Fl. URSS* **28**: 349, 1963——*Microlonchus minimus* *Boiss.*, *Fl. Or.* **3**: 701, 1875——*Jurinea korolkowi* *Rgl. et Schmalh.* in *Act. Hort. Petrop.* **6**: 322, 1880——*Centaurea minima* (*Boiss.*) *B. Fedtsch.*, *Раст. Турк.* **757**, 1915——*C. Vvedenskyi* *M. Pop.* in *Тр. Среднеаз. Гос. Унив. Сер. VIII*, *Бот.* **3**: 111, 1928.

一年生草本,植株低矮。茎极短缩,自基部分枝,分枝铺散。全部分枝有稀疏的叶,被稠密或稀疏的白色绢毛。叶椭圆形或椭圆状倒卵形,长1—1.5厘米,宽0.5—0.6厘米,边缘有凹缺性细锯齿,齿顶有软骨质小尖头,顶端急尖,中下部叶有短叶柄,上部叶几无柄。