

上部长渐尖,中外层平展或下弯,内层上部外面有稠密短糙毛。小花全部为两性,管状,花冠紫红色,长2.5厘米,细管部长9毫米,檐部长1.4厘米,花冠裂片不等大,三角形,长达3毫米。瘦果长椭圆形,浅褐色,长7毫米,宽约2毫米,顶端截形,有果缘,果缘边缘细锯齿,侧生着生面。冠毛褐色,多层,不等长,向内层渐长,长1.5—2厘米,基部连合成环,整体脱落;冠毛刚毛糙毛状。 花果期6—10月。

分布黑龙江、吉林、辽宁、河北、内蒙古、河南、浙江、安徽、江西、湖北及四川。生于山坡林缘、林下或草甸,海拔550—2200米。苏联东西伯利亚及远东地区、朝鲜、日本及蒙古有分布。

175. 漏芦属——*Stemmacantha* Cass.

Cass. in Bull. Soc. Philom. Paris 12, 1817.

多年生草本。茎直立,单生,不分枝或分枝,或无茎。头状花序同型,大,单生茎端或茎枝顶端。总苞半球形。总苞片多层多数,向内层渐长,覆瓦状排列,顶端有膜质附属物。花托稍突起,被稠密的托毛。全部小花两性,管状,花冠紫红色,很少为黄色,细管部几等长或细管部较长,花冠5裂,裂片线形。花药基部附属物箭形,彼此结合包围花丝。花丝粗厚,被稠密的乳突。花柱超出花冠,上部增粗,中部有毛环。瘦果长椭圆形,压扁,4棱,棱间有细脉纹,顶端有果缘,侧生着生面。冠毛2至多层,外层较短,向内层渐长,褐色,基部连合成环,整体脱落;冠毛刚毛糙毛状或短羽毛状。

全属约24种,分布欧洲、非洲、亚洲及大洋洲。我国有两种。

属模式种: *St. centauroides* (L.) Dittrich

分 种 检 索 表

1. 冠毛刚毛糙毛状..... 1. 漏芦 *St. uniflora* (L.) DC Dittrich
1. 冠毛刚毛短羽毛状..... 2. 鹿草 *St. earthmoides* (Willd.) Dittrich

1. 漏芦 祁州漏芦(河北),大脑袋花、土烟叶(陕西),打锣锤(河南),老虎爪(山西),郎头花,狼头花,牛馒头(内蒙古),大口袋花(内蒙古),和尚头(内蒙古)

Stemmacantha uniflora (L.) Dittrich in Candollea 39: 49, 1984. — *Rhaponticum uniflorum* (L.) DC. in Ann. Mus. Paris 16: 189, 1810 et Prodr. 6: 664, 1837; Ldb., Fl. Ross. 2: 751, 1845—1846; Turcz., Fl. Baic.-dahur. 2: 133, 1856; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris 6: 62 (Pl. David. 1: 183, 1884) 1883; Kitam. Mem. Coll. Sci. Kyoto Univ. ser. B. 13: 30, 1937; 东北植物检索表, 416, 1959; Soskov in Fl. URSS 28: 318, 1963; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 20 (3—4): 310, 1967; 中国高等植物图鉴, 4: 654, 1975; H. Ch. Fu in Fl. Intramong. 6: 211, 1982 — *Cnicus uniflorus* L., Mant. Altera 572, 1771 — *Centaurea monanthos* Georgi, Reise 1: 231,