

腺毛。小花紫红色或白色，长8—10毫米，细管部长4—5毫米，檐部长5毫米。瘦果圆柱状，长3毫米，被蛛丝状毛，有横皱纹。冠毛白色，2层，外层短，糙毛状，长2毫米，内层长，羽毛状，长8毫米。 花果期8—9月。

分布西藏（仲巴、林周、拉萨、加查、米林）。生于河滩沙地、沙丘、山坡沙地；海拔2920—4100米。模式标本采自西藏拉萨。

6. 云状雪兔子

Saussurea aster Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **30**: 115. t. 5. 1894 et **35**: 185. 1902; Pamp., Fl. Caracorum 210. t. 7. fig. 3. 1930; Schmid in Fedde Repert. Sp. Nov. **31**: 68. 1932; Lipsch in Nov. Syst. Pl. Vas. **1964**: 319. 1964 et **1966**: 226. 1966 et Gen. Saussurea 50. 1979; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **20**(3—4): 316. 1967; 西藏植物志 **4**: 875. 1985.

无茎多年生一次结实的莲座状草本。根肉质。根状茎粗，直径1—1.4厘米，被稠密的叶柄残迹。叶莲座状排列，线状匙形、椭圆形或线形，长1.5—3厘米，宽1.5—4毫米，顶端钝，边缘全缘，基部楔形渐狭成短柄，柄基扩大，两面灰白色，被稠密的或褐色的绒毛，中脉1条，在叶下面明显。头状花序无小花梗，多数，在莲座状叶丛中密集成半球形、直径为2.5厘米的总花序。总苞圆柱状，直径5毫米；总苞片3—4层，近等长，卵形至线形，长4—6毫米，宽1.5—3毫米，顶端急尖，外面被白色绒毛。小花紫红色，长6.5毫米，细管部长3.5毫米，檐部长3毫米。瘦果褐色，圆柱状，长2毫米。冠毛鼠灰色，2层，外层短，糙毛状，长3毫米，内层长，羽毛状，长7毫米。 花果期6—8月。

分布青海、西藏（日土、班戈、双湖、南木林、比如、丁青、八宿、芒康、左贡）。生于高山流石滩；海拔4500—5400米。模式标本采自西藏。

7. 硕首雪兔子

Saussurea grandiceps S. W. Liu, Fl. Xizang **4**: 874. 1985.

多年生一次结实莲座状草本。根圆锥状，肉质。根状茎被褐色的残存的叶。叶莲座状，无叶柄，线状披针形，长2—8厘米，宽5—8毫米，中部以上长渐尖，基部较宽，中部边缘有少数稀疏的小尖齿，两面几同色，上面绿色，无毛，下面浅绿色或灰绿色，被薄蛛丝毛。头状花序大，单生根状顶端的莲座状叶丛中。总苞半球形，直径4.5厘米；总苞片4层，外层卵状披针形，长1.7厘米，宽5—6毫米，中层披针形或披针状椭圆形，长2—2.1厘米，宽4—5毫米，内层长椭圆状披针形，长2.1厘米，宽3—3.5毫米；全部总苞片顶端渐尖，边缘黑紫色，外面或上部外面被白色稀疏的长而直的细毛。小花蓝紫色，长1.9—2厘米，细管部长1.3—1.4厘米，檐部长6毫米。瘦果圆柱状，长5毫米，有横皱纹，顶端有浅的边缘。冠毛2层，褐色，外层较短，糙毛状，长7毫米，内层长，羽毛状，长1.4厘米。 花果期8月。