

分布新疆(清河、阿勒泰、富蕴)。生于农田、潮湿地、水塘边,海拔540—1200米。俄罗斯及蒙古有分布。模式标本采自西伯利亚。

56. 类尖头风毛菊

Saussurea pseudomalitiosa Lipsch. in Bull. Soc. Nat. Mosc. Biol. n. s. lix. Livr. 59 (6): 76. 1954 et Gen. Saussurea 80. 1979.

二年生草本。根纺锤状。茎单生或少数,高25—35厘米,被稀疏短柔毛,自基部分枝,分枝多数,由于叶下延而多少有翼,翼狭窄,有锯齿。叶被稀疏的柔毛,全形线形或线状披针形,羽状半裂或羽状全裂,裂片三角形,全缘或有小锯齿;基生叶有柄;茎生叶无柄,多少下沿。头状花序每3—5个集成伞房状花序,多数伞房花序组成圆锥状花序。总苞卵状,长1.2—1.5厘米,有光泽;总苞片5层,线状披针形,急尖,顶端有黑片的附片。花托有托片。小花红色,长1.1—1.2厘米。冠毛2层,外层糙毛状,长2毫米,内层长1—1.1厘米,羽毛状。花果期8月。

分布青海(柴达木),海拔3300米。模式标本采自青海柴达木。

标本未见,上述记载取自本种的原始描写。

57. 京风毛菊 图版11: 6—11

Saussurea chinampoensis Lévl. et Vaniot in Bull. Géorg. Bot. Mans. 20: 145. 1909; Nakai in Bot. Mag. Tokyo 29: 209. 1915; Mori, Enum. Pl. Corea 364. 1922; Nakai, Fl. Sylv. Koreana 14: 117, 1923; Kitam. in Act. Phytotax. et Geobot. 4 (1): 3. 1935 et 7: (1): 58. 1938 et in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. 16 (2): 69. 1940; Chen in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot. 6 (2): 90. 1935; Kitag., Lineam. Fl. Manshur. 462. 1939; 刘慎谔等,东北植物检索表 420. 1959; Lipsch. in Nov. Syst. Pl. Vas. 1965. 255. 1965 et Gen. Saussurea 88. 1979; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 20 (2—3): 318. 1967; 中国高等植物图鉴 4: 640. 图 6694. 1975; Lauener in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 34 (3): 377. 1976; 内蒙古植物志 6: 238. 1982; 河北植物志,下册 1097. 1984; 黄土高原植物志 5: 422. 1989; 河北植物志 3: 168. 1991; 辽宁植物志,下册 593. 1992. —*Theodorea chinampoensis* (Lévl. et Vaniot) Soják in Novit. Bot. Hort. Bot. Univ. Carol. Pragense, 1962: 49. 1962. —*Saussurea peipingensis* Chen in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot. 5 (2): 87. 1934; Kitag., Iconogr. Pl. As. Orient. 1 (4): 79. t. 36. descr. ampl. 1936; Hand.-Mazz. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin 13: 648. descr. emend. 1937; Kitam. in Mem. Coll. Sci. Kyoto Univ. ser. B. 24 (1): 46. 1957; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 21 (1—2): 6. 1968. pro synonym. *S. chinampoensis* Lévl. et Vaniot.

一年生或二年生草本,高10—60厘米。茎单生,自基部长分枝,分枝直立,全部茎枝无毛或几无毛。基生叶基部渐狭成短柄,叶片质地厚,线形、线状长椭圆形、倒披