

1968; Lipsch., Gen. Saussurea 118. 1979.

多年生垫状草本，高 19 厘米。茎直立，麦秆黄色，被白色稠密或稀疏的长棉毛或长柔毛，基部被稠密的鞘状残迹。基生叶长圆状线形，长 3—5 厘米，宽 3—5 毫米，顶端急尖，基部楔形收缩成长或短柄，柄基鞘状扩大，鞘基与柄基内面被稠密的白色长棉毛。茎生叶少数，长圆状线形，长 3 厘米，宽 3 毫米，基部渐狭成长达 2 厘米的叶柄；全部叶质地坚硬，两面或仅下面被稀疏或稠密的长棉毛，边缘全缘，反卷。头状花序 7—12 个，在茎枝顶端排成紧密的伞房花序，花序梗极短。总苞圆柱状倒卵形，直径 9 毫米；总苞片 4 层，外层长圆形，长 6.5 毫米，宽 2.5 毫米，上部外面被稀疏的长柔毛，内层线状长椭圆形，长 1 厘米，宽 1 毫米，全部总苞片质地坚硬，麦秆黄色，顶端急尖。小花淡红色，长 9 毫米，细管部与檐部各长 4.5 毫米。瘦果褐色，长 4 毫米，有瘤状横皱纹。冠毛 2 层，外层短，白色，糙毛状，长 2 毫米，内层长，褐色，羽毛状，长 8 毫米。 花果期 7 月。

分布甘肃、青海（柴达木）、西藏。生境不详，海拔 1 100—1 200 米。模式标本采自甘肃。

94. 美丽风毛菊

Saussurea pulchra Lipsch. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS 10: 389. 1959, tantum nomen et Gen. Saussurea 118. 1979. ——*Hemistephtia pulchra* (Lipsch.) Soják in Novit. Bot. Hort. Bot. Univ. Carol. Pragense 1962: 49. 1962. ——*Saussurea bella* Lipsch. in Bull. Soc. Nat. Mosc. Biol. n. s. lxx. Livr. 59 (6): 83. 1954, non Ling 1949.

多年生草本，高 8—27 厘米。根状茎粗短，被稠密的褐色叶残迹。茎直立，上部有开展或斜升的 1—3 个长或短分枝或不分枝，全部茎枝灰绿色或灰白色，被薄棉毛。基生叶稠密，茎生叶稀疏，全部叶无柄，线形，长 1—2.5 厘米，宽 1.2 毫米，顶端急尖或钝，边缘全缘，反卷，极少边缘少锯齿，上面黄绿色，无毛，下面灰白色，被稠密的短棉毛。头序花序单生茎端或 2—4 头状花序在茎端与枝顶成明显或不明显的伞房花序状排列，有长或短花序梗。总苞楔形，直径 1 厘米；总苞片 5 层，外层披针形，长 6 毫米，宽 1.5 毫米，顶端渐尖，外面被稀疏的白色棉毛，中层椭圆形、椭圆状披针形或长圆形，长 6—9.5 毫米，宽 1.5—2 毫米，顶端渐尖或急尖，有稀疏的白色棉毛，内层线状长椭圆形或宽线形，长 1.5—1.9 毫米，宽 1.8—2 毫米，顶端渐尖，有白色稀疏的棉毛，全部总苞片外面紫色，顶端有软骨质小尖头。小花紫色，长 2.2 厘米，细管部与檐部各长 1.1 厘米。瘦果青绿色，长 5.5 毫米，有瘤状突起，具横皱纹。冠毛 2 层，白色，外层短，糙毛状，长几 3 毫米，内层长，羽毛状，长 1.6 厘米。 花果期 8—9 月。

分布甘肃（玉门、夏河）、青海（同仁）。生于砂质河谷；海拔 1 920—2 800 米。模式标本采自甘肃。

95. 乌恰风毛菊