

121. 华美风毛菊

Saussurea compta Franch. in Journ. de Bot. **10** (24): 422. 1896; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. **12**: 321. 1838; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **20** (3—4): 319. 1967; Lipsch., Gen. Saussurea 134. 1979. — *S. chrysanthemumoides* Chen in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot. **6** (2): 97. 1935; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **20** (3—4): 319. 1967; Lipsch. in Journ. Bot. URSS **61** (10): 1433. 1976.

多年生草本，高 30—50 厘米。茎纤细，基部直径 3 毫米，多叶，自中部以上被稀疏蛛丝毛及多细胞节毛或几无毛，顶端有伞房花序状短分枝。基生叶及下部茎叶花期脱落；中部茎叶有短柄，叶片全形长椭圆形，长 4—5 厘米，宽 1.5 厘米，羽状全裂，侧裂片 2—3 对，长圆形，披针形或长三角形，顶端急尖或钝，边缘全缘或仅一侧有 1 浅齿或每侧各有 1 浅齿，顶裂片尾状；上部茎叶渐小，无柄或几无柄，与中部茎叶同形并等样分裂，侧裂片 1—2 对，全部叶两面色，上面绿色，粗糙，被稀疏的硬毛，下面白色，被稠密的白色绒毛。头状花序少数，在茎顶排成小型伞房花序，有花序梗。总苞倒圆锥状长圆形，直径 7 毫米；总苞片 6 层，外层卵形，长 2 毫米，宽 1.5 毫米，顶端钝或急尖，上部被白色短柔毛，中层椭圆形，长 4 毫米，宽 1 毫米，顶端钝，上部被白色稀疏短柔毛，内层线状长椭圆形，长 8 毫米，宽 1.5 毫米，顶端钝，边缘有稀疏的白色长柔毛。小花紫色，长 8 毫米，细管部与檐部各长 4 毫米。瘦果黑褐色，长 2.8 毫米。冠毛白色，2 层，外层短，糙毛状，长 2 毫米，内层长，羽毛状，长 1 厘米。 花果期 11 月。

分布四川（康定）。生于草原向阳处，海拔 2 600 米。模式标本采自康定。

组 5. 全叶组 Sect. 5. *Pycnocephala* Lipsch. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS **16**: 447. 1954 et Fl. URSS **27**: 392. 1962 et Gen. Saussurea 143. 1979. — *Lagrostemon* Cass. in Dict. Sci. Nat. **53**: 466. 1828. non auct. plur. p. p. — *Saussurea* DC. Sect. *Lagrostemon* (Cass.) DC., Prodr. **6**: 532. 1838. p. p. — *Saussurea* DC. Sect. *Caulescentes* Hook. f., Fl. Brit. Ind. **3**: 370. 1881. p. min. p.; Chen in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot. **6** (2): 81. 1935. p. min. p.; Ling in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping **3** (4): 154. 1935. p. p. — *Saussurea* DC. Sect. *Chaetocline* Franch. in Journ. de Bot. **2** (18): 311. 1888.

根及根状茎不纤维状撕裂亦不为纤维所包围。头状花序大，单生茎顶，或有时多少多数密集成总状花序状或伞房圆锥状排列。花托有托片或无托片或托片短尖头状。花药尾部有棉毛或撕裂。瘦果黑色，顶端有小冠，小冠边缘全缘或有时有锯齿。冠毛 2 层。多年生草本，或簇生或单生或茎少数。

全组有 21 种；我国有 18 种。

组模式：大头风头菊 *S. baicalensis* (Adams) Robins.