

2—3 毫米，暗绿色，被白色柔毛，有时先端外卷，内层宽条形，长达1.6 厘米，宽3 毫米，禾秆黄色，上部暗绿色，被毛；花紫色，长达2 厘米。瘦果圆柱形，长4—4.5 毫米，无毛；冠毛淡褐色，外层短，糙毛状，内层羽毛状。

产西藏米林、林芝、加查。生于山坡灌丛，海拔3 800—4 700 米。印度西北部、尼泊尔、锡金也有。模式标本采自印度。

143. 尼泊尔风毛菊

Saussurea nepalensis Spreng., Syst. Veget. **3**: 380. 1826; Sch.-Bip., Linnaea **19**: 330. 1846; Lipsch. in Nov. Syst. Pl. Vasc. **1968**: 228. 1968 et Gen. Saussurea 164. 1979. —*Aplotaxis nepalensis* (Spreng.) DC. **6**: 539. 1838. —*Saussurea eriostemon* Wall., Numer List 100. n° 2912. nomen. 1831. —*Theodorea taraxacifolia* Kuntze, Rev. Gen. **1**: 367. nomen. 1891. —*Saussurea chapmannii* C. E. C. Fisch. in Kew Bull. **7**: 287. 1938; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **20** (3—4): 318. 1967.

草本。茎单生或成对，细，无毛或上部被稀疏棉毛，基部被纤维状撕裂的叶柄残迹。基生叶少数或多数，有叶柄，叶柄长1—7 厘米，叶片全形长圆形或倒披针长圆形，长4—18 厘米，宽1.3—3 厘米，倒向羽状半裂，侧裂片对生或互生，狭三角形至半圆形，长宽达1.2 厘米，顶部急尖，有小尖头，向下方的侧裂片渐大，边缘尖头状锯齿至尖头状浅裂，边缘有皱波状毛；茎生叶小，相似基生叶，1—2 枚。头状花序单生茎顶，钟状，直径1.5 厘米；总苞5—6 层，外层长圆状披针形，长1 厘米，宽4 毫米，顶端急尖，向上黑绿色或紫蓝色，顶端反折，内层上半部黑紫色，长1.9 厘米，宽3 毫米，顶端急尖或渐尖。小花紫色。瘦果长圆状，长3.5—4.5 毫米，顶端有齿状小冠。冠毛褐色，外层细，毛状，内层粗，长1.8 厘米，全部冠毛羽毛状。花果期8—10 月。

分布西藏（亚东）。生于河谷或路边，海拔3 700—4 200 米。锡金、尼泊尔也有分布。模式标本采自尼泊尔。

144. 巴东风毛菊

Saussurea henryi Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **29**: 311. 1892; Diels in Bot. Jahrb. **29**: 623. 1901; Ling in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping **3** (4): 156. 1935; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **20** (3—4): 329. 1967; Lipsch. in Nov. Syst. Pl. Vasc. **1968**: 228. 1968 et Gen. Saussurea 162. 1979; 秦岭植物志 **1** (5): 353. 1985.

多年生草本，高14—80 厘米。根状茎短。茎直立，细弱，单生，不分枝或分枝，上部被蛛丝状绒毛或几无毛。基生叶有叶柄，叶柄长1—3.3 厘米，柄基扩大半抱茎，叶片长椭圆形，长7—12.5 厘米，宽2.5—4.5 厘米，羽状全裂，侧裂片6—11 对，均匀分布，线形；中下部茎叶逐渐变小，与基生叶同形并等样分裂，有长0.5—2 厘米的叶柄；中部以上的叶苞片状，线形；全部叶两面同色，绿色，无毛或被稀疏短糙毛。头状花序单生茎端或1—3 个生茎枝顶端。总苞钟状，直径1—1.3 厘米；总苞片5 层，被稀