

县。

本种与红背兔儿风 *A. rubrifolia* Franch. 极近缘，主要不同点在本种的叶背面仅于脉上呈紫红色，叶柄的密毛不平展而向下垂，头状花序于茎顶复排成穗状花序。

7. 厚叶兔儿风

Ainsliaea crassifolia Chang in *Sinensia* 6: 549. 1935; S. Y. Hu in *Quart. Journ. Taiwan Mus.* 18: 95. 1965.

多年生草本。根状茎粗大，直伸或上部弯曲，锥状，直径1—1.5厘米，根颈密被浅褐色绵毛；根稍带肉质，长可达18厘米。茎直立，高约60厘米，不分枝，多叶，直径3—5毫米，厚被白色绵毛，下部节间长5—6厘米，上部的节间较短。叶基生的斜升，莲座状，叶片卵形，长9—13厘米，宽6—11厘米，顶端钝或圆，基部心形，边缘具波状齿，齿端有黑色尖头，凹缺弧形弯拱，上面散生微白色的小糙伏毛，下面密被白色绒毛；叶脉近掌状，主脉3—5条，向边缘弯拱网结，网脉两面均明显；叶柄长4—11厘米，被白色绵毛，无翅，基部扩大；茎生叶小，疏离，下部的卵形，具5厘米长的柄，中部和上部的更小，具短柄或近无柄。头状花含花3朵，无梗，单生或2—3聚集于茎顶作穗状花序式排列；总苞圆筒形，直径6—7毫米；总苞片约5层，草质，背部具1条显著的绿色中脉，近无毛，外层卵形，长2—3毫米，宽约2毫米，顶端具硬锐的凸尖头，中层卵状披针形，长5—6毫米，宽约2毫米，顶端凸尖，尖头锐利，最内层披针形，顶端渐尖，边缘薄，干膜质，长约11毫米，宽2—2.2毫米；花托不平，无毛，直径约1.5毫米。花全部两性；花冠管状，长约15毫米，冠檐稍扩大，5深裂，裂片偏于一侧，长圆形，不等长，长4—6毫米；花药长约7.5毫米，顶端圆，基部的尾较宽，长约2.5毫米；花柱分枝顶端钝头，具乳头状突起，长约1毫米。未成熟瘦果锥状，长仅2.5毫米，被疏长柔毛。冠毛污白色，羽毛状，基部联合，长11—12毫米。花期7—9月。

产于云南北部（中甸、宁蒗、丽江、大理、永胜）及四川西南部（九龙）。生于山坡林缘或草丛中，海拔2750—3000米。模式标本采自云南永胜。

8. 泸定兔儿风

Ainsliaea mollis Diels ex Limpr. in *Fedde Repert. Sp. Nov. Beih.* 12: 514. 1922; S. Y. Hu in *Quart. Journ. Taiwan Mus.* 18: 98. 1965.

多年生草本。根状茎粗壮，圆柱形，直或微弯，直径8—12毫米，根颈密被白色或淡褐色绵毛。茎直立，单一，不分枝，花葶状，高30—55厘米，直径2—3毫米，密被白色绒毛。叶基生的莲座状，叶片厚纸质，卵形至阔卵形，长4—8厘米，宽2.3—7厘米，顶端钝，基部心形，边缘浅波状，具胼胝体状细齿，上面绿色，密被绢毛状微绒毛，下面白色，厚被绒毛，脉上杂以长柔毛；基出脉5条，下面显著凸起，中脉上部的1—2对侧脉细弱，弯拱上升，网脉不明显；叶柄长2—9厘米，无翅，密被白色长柔毛，基部明显扩大；茎生叶小，疏离（节间长6—8厘米），下部的卵形至卵状披针形，上部的长圆形，长1.5—2厘米，宽5—15毫米，顶端钝，基部圆，边缘具点状疏齿，叶柄长3—10毫米，其