

9—11月。

产于贵州（印江）、四川（城口、巫山、南川）、湖北（鹤峰、神农架）、湖南（新宁、江华、宜章）、广西（那坡、龙胜、全县、兴安、桂林、金秀、昭平、象州县、桂平）、广东（信宜、封开、高要、连县、阳山、乳源）、江西（安福、井冈山）。生于山地丛林或涧旁石缝中，海拔400—1640米。模式标本采自四川城口。

35. 蓝兔儿风

Ainsliaea caesia Hand.-Mazz. in Beih. Bot. Centralbl. **56**(B): 469. 1937; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **18**: 95. 1965.

多年生草本。根状茎短，圆球状或横走而呈结节状，根颈被淡褐色绒毛。茎直立，单一，不分枝，高30—75厘米，被疏柔毛或最后变无毛。叶聚生于茎中部或中部之下，呈莲座状或否，叶片纸质，淡蓝色或蓝紫色，披针形，长4.5—7厘米，宽1.4—3厘米，顶端短尖，基部楔状渐狭，边缘具胼胝体状细齿，上面老时近无毛，下面被淡褐色粗长柔毛，脉上尤著；中脉在上面平坦，在下面微凸起，侧脉2对，下面的1对基出或近基出，斜上举，较上的1对自中脉中部发出，弧形上升，离缘弯拱连接，网脉明显，网眼疏；叶柄长1—6厘米，上面有沟槽，密被丝质污白色长柔毛；花葶长15—60厘米，疏被短柔毛。头状花序具花3朵，于花期直径6—7毫米，单个或4—5个成束于花序轴复作穗状花序式排列；总苞倒锥形，直径4—5毫米，向下渐狭；总苞片多层，下部的排成柄状，小，卵形，长与宽均不超过1/2毫米，无毛，中层卵状长圆形，背部具1脉，无毛，长1.5—3毫米，宽1—1.2毫米，顶端钝，最内层线状披针形，长10—13毫米，宽近1毫米，顶端略尖；花托小，平坦，无毛，直径约0.3毫米。花全部两性，花冠略露出于冠毛之外，长约1毫米，不开裂，闭花受精；花药内藏，长约5.5毫米，顶端钝圆，基部的尾很尖，长约为花药的1/3；花柱长约7毫米，花柱分枝短而扁，顶端钝，长约0.5毫米。瘦果纺锤形，干时变黑色，长约5毫米，除顶端（冠毛之下）外无毛。冠毛污黄色，羽毛状，长约8毫米，基部联合成束。花期10—12月。

产于湖南南部（武冈、道县）、江西南部及广东北部（英德）。生于山地水旁或密林中，海拔900—1150米。模式标本采自广东北部英德龙头山。

36. 车前兔儿风

Ainsliaea plantaginifolia Mattf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin **11**: 107. 1931; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **18**: 99. 1965.

多年生草本。根状茎粗短，微曲，直径可达6毫米，根颈被白色绒毛；根细弱，簇生，纤维状，长6—13厘米。茎直立或有时下部的平卧，单一，除花序外不分枝，高30—55厘米，直径4—5毫米，无毛或仅于叶腋及叶痕内侧被疏长柔毛。叶聚生于茎的上部或顶部，呈莲座状，叶片纸质，卵状菱形或近卵形，长6—10厘米，宽3.5—6厘米，顶端渐尖，基部突然变狭或稍渐狭而沿叶柄短下延，边缘浅波状，具1.2—2毫米长的胼胝体状尖齿，两面均无毛；叶脉掌状，两面几不凸起，基出的1对侧脉比中脉略细，弧形上