

圆形或线形，顶端突尖，边缘每侧仅于近顶部具 1—3 个刺状尖齿，基部仅 1 脉而迥然有别。

39. 华南兔儿风 狭叶兔儿风(中国高等植物图鉴) 图版 11: 4—7

Ainsliaea walkeri Hook.f. in Curtis's Bot. Mag. 102: t. 6225. 1876; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 472. 1888; Beauverd in Bull. Soc. Genève ser. 2, 1: 384. 1909; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Add. ser. 10: 149. 1912; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 18: 102. 1965; 中国高等植物图鉴 4: 665. 图 6744, 1975.


多年生、矮小草本。根状茎直短，或曲膝状或斜卧而呈结节状，直径 2—4 毫米，根颈通常无毛，具细长簇生的须根。茎直立，单一，不分枝或自根颈发出数枝而呈丛生状，高 20—40 厘米，直径 1—3 毫米，下部无毛，上部自叶丛至花序轴略被短柔毛。叶聚生于茎的中下部，离基 7—16 厘米，下方数片疏离，余者密集，叶片纸质，狭长圆形或线形，长 3—7 厘米，宽 3—7 毫米，顶端凸尖，中部向下渐狭，边缘背卷，每侧仅于近顶部具 1—3 刺状尖齿，中下部边缘无齿，上面绿色，下面淡绿色，两面均无毛；中脉两面显著凸起，无侧脉或中部以上具 1—2 对极柔弱侧脉，网脉无；叶柄长 5—13 毫米，无毛，基部稍扩大。头状花序平展或下垂，具被腺状短柔毛的短梗，通常有小花 3 朵，极稀有 2 朵，于茎顶作狭圆锥花序式排列；圆锥花序轴粗而坚挺，分枝短，柔弱，基部具钻形的小苞叶；总苞圆筒形，直径 2.5—3 毫米；总苞片约 5 层，背部有纵纹，无毛，顶部和边缘带紫红色，外 1—2 层卵形，长 1—2 毫米，宽 0.5—1 毫米，顶端短渐尖，中层卵状披针形，长 3.5—5 毫米，宽 1.2—1.4 毫米，顶端渐尖，最内层披针形，有时基部略狭，长约 10 毫米，宽 1.5—2 毫米，顶端渐尖，尖头钝，边缘干膜质；花托狭，不平，无毛，直径约 0.8 毫米。花全部两性，花冠白色，长约 1 厘米，花冠管部纤细，长约 4 毫米，管口上方 5 深裂，裂片偏于 1 侧，不等大，线形，稍长于花冠管；花药紫红色，外露，长 4.5 毫米，顶端钝圆或近截平，基部的尖尾长为花药的 1/3；花柱分枝伸出药筒之外，扁，顶端钝圆，长不足 0.5 毫米。瘦果圆柱形，密被粗毛，长约 3 毫米。冠毛污白色，羽毛状，长约 6 毫米，基部稍联合。花期 10—12 月。

产于广西南部（十万大山）、广东南部（阳春及南部沿海岛屿）和福建西南部（云霄）。生于海拔 700 米以下的溪旁石上或密林下湿润处。模式标本采自广东南部沿海岛屿。

40. 无翅兔儿风

Ainsliaea aptera DC. Prodr. 7: 14. 1838; C. B. Clarke, Comp. Ind. 274. 1876; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 388. 1881; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39: 415. 1911; Kitamura in Hara, Fl. E. Himal. 330. 1966, op. cit. 131. 1971, et in Acta Phytotax. Geobot. 23: 5. 1968; 西藏植物志 4: 919. 1985.

多年生草本。根状茎直或弯拱平卧，直径 3—5 毫米，根颈密被污黄色绒毛；根簇生，细弱，纤维状。茎直立，单一或 2—3 丛生，除花序外不分枝，高 40—70 厘米，被长



图版 11 1—3. 三脉兔儿风 *Ainsliaea trinervis* Y. C. Tseng: 1. 植株; 2. 叶放大; 3. 头状花序。4—7. 华南兔儿风 *Ainsliaea walkeri* Hook. f.: 4. 植株; 5. 叶放大; 6. 头状花序; 7. 花。(邓盈丰绘)