

米。 花期 8—9 月。

产于云南西北部（贡山、鹤庆）、四川西部至西南部（马尔康、理县、盐源、普格）和西藏（拉萨）。生于荒坡或松林中，海拔 2 200—2 500 米。模式标本采自鹤庆大坪子。

6. 翼齿大丁草

Gerbera pterodonta Y. C. Tseng in Acta Bot. Austr. Sinica 3: 9. 图版 1: 3, 1986.

多年生草本。根状茎短，为纤维状的枯残叶基所围裹，具疏生细长须根。叶基生，莲座状，淡红色，叶片纸质，卵形至卵状披针形，长 6—10 厘米，宽 4—5 厘米，顶端短尖，基部近截平或略狭，下延，边缘有规则的圆齿，齿上具 1—2 凸尖头，上面无毛，但密被白色小腺点（放大镜下始见），下面疏被蛛丝状毛；中脉两面均凸起，下面尤著，侧脉 5—6 对，弧形上升，离缘弯拱网结，网状脉两面均明显；叶柄长 20—25 厘米，多少被蛛丝状毛，具翅，翅向下渐狭而上部的有齿。花葶单生，直立，纤细，长约 35 厘米，被蛛丝状绵毛，具疏生、线状钻形、长 10—15 毫米的苞叶。头状花序单生于花葶之顶，直径 1.5—2 厘米；总苞钟形，短于冠毛，总苞片约 3 层，全部线形，背部被蛛丝状毛，顶端带紫红色，外层的顶端短尖，长 5—6 毫米，宽约 0.5 毫米，中层的长约 10 毫米，宽约 1 毫米，最内层的长 15—16 毫米，宽近 1 毫米，二者顶端均钝或有时略尖；花托无毛，直径约 3 毫米。花小，淡黄色；雌花 1 层，长约 8 毫米，花冠管状，顶端具 4—5 齿，齿极不等大；两性花多数，花冠近二唇形，外唇具 3 细齿，内唇具 2 细齿；花药线形，内藏，长约 2 毫米，基部具小的尖尾；两性花的花柱分枝短，顶端钝。瘦果纺锤形，具 8 纵棱，被微柔毛，长约 7 毫米。冠毛粗糙，黄褐色，长 11—12 毫米。 花期 10—11 月。

产于湖北西部（鹤峰）。生于山坡草丛中，海拔约 1 600 米。模式标本采自湖北西部鹤峰县。

7. 大丁草

Gerbera anandria (Linn.) Sch.-Bip. in Flora 27: 782. 1844; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 472, 1888; Diels in Bot. Jahrb. 29: 630. 1901; Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève ser. 2, 2: 44. 1910; Lév. Fl. Kouy-Tcheou 95. 1914; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 7: 326. 1931; Mattf. in Acta Hort. Gotob. 8: 81. 1933; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 1176. 1936; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 19: 268. 1966; Lauen. in Not. Bot. Gard. Edinb. 34(3): 386. 1976. — *Tussilago anandria* Linn. Sp. Pl. 865. 1753. — *Perdicium tomentosum* Thunb. Fl. Jap. 319. 1784. — *Gerbera cavaleriei* Vaniot et Lév. in Bull. Soc. Bot. France 53: 550. 1906; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 19: 269. 1966. — *Gerbera bonatiana* (Beauverd) Beauverd form. *cavaleriei* (Vaniot et Lév.) Lév. Cat. Pl. Yunnan 45. 1915. — *Gerbera integripetala* Hayata, Ic. Pl. Forms. 6: 27. 1916. — *Gerbera laevipes* Gand. in Bull. Soc. Bot. France 65: 38. 1918. — *Gerbera anandria* (Linn.) Sch.-Bip. var. *integripetala* Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agr. 8: 279. 1936. — *Leibnizia anandria* (Linn.) Turcz. В Щеглов, Указ. Открыт. 8: 404. 1831; Nakai in Journ. Jap. Bot. 13: 852. 1937; Kitamura in