

1. 水麦冬(中国高等植物图鉴) 图版 10

Triglochin palustre Linn., Sp. Pl. 338. 1753; Hand. -Mazz., Symb. Sin. 7: 1190. 1936; 中国高等植物图鉴 5: 16. 图 6862. 1976; 北村四郎, 原色日本植物图鉴 3: 400. 1977; 西藏植物志 5: 13. 图 9. 1987. — *Juncago palustris* Moench, Meth. Pl. 644. 1794.

多年生湿生草本, 植株弱小。根茎短, 生有多数须根。叶全部基生, 条形, 长达 20 厘米, 宽约 1 毫米, 先端钝, 基部具鞘, 两侧鞘缘膜质, 残存叶鞘纤维状。花葶细长, 直立, 圆柱形, 无毛; 总状花序, 花排列较疏散, 无苞片; 花梗长约 2 毫米; 花被片 6 枚, 绿紫色, 椭圆形或舟形, 长 2—2.5 毫米; 雄蕊 6 枚, 近无花丝, 花药卵形, 长约 1.5 毫米, 2 室; 雌蕊由 3 个合生心皮组成, 柱头毛笔状。蒴果棒状条形, 长约 6 毫米, 直径约 1.5 毫米, 成熟时自下至上呈 3 瓣开裂, 仅顶部联合。 花果期 6—10 月。

产东北、华北、西北、西南。常生于咸湿地或浅水处。也分布于北美、欧洲及亚洲。

2. 海韭菜(中国高等植物图鉴) 图版 11

Triglochin maritimum Linn., Sp. Pl. 339. 1753; Buch. in Engl. Pflanzenr. 16 (IV 14): 8. 1903; Hand. -Mazz., Symb. Sin. 7: 1190. 1936; 中国高等植物图鉴 5: 16. 图 6861. 1976; 西藏植物志 5: 13. 图 8. 1987.

多年生草本, 植株稍粗壮。根茎短, 着生多数须根, 常有棕色叶鞘残留物。叶全部基生, 条形, 长 7—30 厘米, 宽 1—2 毫米, 基部具鞘, 鞘缘膜质, 顶端与叶舌相连。花葶直立, 较粗壮, 圆柱形, 光滑, 中上部着生多数排列较紧密的花, 呈顶生总状花序, 无苞片, 花梗长约 1 毫米, 开花后长可达 2—4 毫米。花两性; 花被片 6 枚, 绿色, 2 轮排列, 外轮呈宽卵形, 内轮较狭; 雄蕊 6 枚, 分离, 无花丝; 雌蕊淡绿色, 由 6 枚合生心皮组成, 柱头毛笔状。蒴果 6 棱状椭圆形或卵形, 长 3—5 毫米, 径约 2 毫米, 成熟后呈 6 瓣开裂。 花果期 6—10 月。

产东北、华北、西北、西南各省区。生于湿砂地或海边盐滩上。也广布于北半球温带及寒带。

2. 眼子菜属——*Potamogeton* Linn.

Linn., Sp. Pl. 126. 1753, et Gen. Pl. 61. 1754; Benth. et Hook. f., Gen. Pl. 3: 1014. 1883; Asch. et Graebn. in Engl. Pflanzenr. 31 (IV 11): 39. 1907.

多年生或一年生水生草本。常具横走根茎, 稀根茎极短或无根茎。茎圆柱形、椭圆柱形或极扁。叶互生, 有时在花序下面近对生, 单型或两型, 漂浮水面或沉没水中, 具柄或无柄; 叶片卵形、披针形、椭圆形、矩圆形、条形或线形; 叶脉因叶型和叶形的不同而为 3 至多



1—3. 海韭菜 *Triglochin maritimum* Linn.:

1. 植株, 2. 花, 3. 果实。(陈宝联绘)