

Vetenskapsakad. Handl. **55**(5): 46. f. 18L. 1916.

本变种以植株较粗壮,叶较宽,达 2—2.5 毫米,先端具小突尖等特征而与原变种明显不同,野外观察中在形体上二者差别显著。

产陕西(关中)、甘肃(中卫)等地。生于清水河沟等流水中,水体微酸性。分布于原苏联、挪威等欧洲国家。

27c. 内蒙眼子菜(内蒙古植物志)

Potamogeton pectinatus Linn. var. **interruptus** (Kit.) Asch., Fl. Prov. Brandenburg. **1**: 666. 1864; Asch. et Graebn. in Engl., Pflanzenr. **31**(IV 11): 124. — *P. interruptus* Kit. in Schult. Osterr. Fl. ed. 2. 328. 1814. — *P. intramongolicus* Ma in Acta Bor.-Occ. Sin. **3**(1): 8; 1983; 内蒙古植物志 **7**: 12. f. 6. 1983.

本变种以植株粗壮;茎粗可达 3—4 毫米,根茎具 4 棱而与原变种不同。

产内蒙古(乌兰察布盟)。生于 1—2 米深湖水中,海拔 1200 米。欧洲、日本、北非、马达加斯加、北美及南美也有分布。

28. 矮眼子菜(水生生物学报)

Potamogeton nanus Y. D. Chen in Acta Hydrobiol. Sin. **11**(3): 231. f. 2. 2. 1987.

沉水草本。根茎短或不明显。茎丛生,丝状,长 4—6 厘米,直径约 0.5 毫米,节间长 0.5—1.5 厘米。叶丝状,深绿色,长 3—4 厘米,宽约 0.2 毫米,横切面近三棱形,先端渐尖,基部与托叶贴生成鞘,鞘长 1 厘米,顶端具小舌片,长约 4 毫米,叶脉 1 条。穗状花序,具花 4 对,间断排列;苞片膜质,长 1—1.5 毫米,宽 1.5—2.5 毫米,边缘浅裂;花被片圆形,花丝不等长,基部合生。果扁,斜倒卵形。

解剖特征:茎的皮层中微具少数散生机械束;维管束中木质管道不明显。

产青海(青海湖)。水质碱性。

29. 长鞘菹草(新拟)

Potamogeton recurvatus Hagström in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. **55**(5): 37. f. 13—14. 1916.

沉水草本。根茎发达。茎圆柱形,上部多分枝;节间长达 6—12 厘米,通常在下部较长,上部较短。叶线形,极长,在茎的下部长可达 50 厘米,向上逐渐较短,最上面的叶长 5—12 厘米,叶宽 1—1.5 毫米,近于笔直,具纵的沟槽,先端钝,顶部稍向后反卷,基部与托叶贴生成鞘;叶鞘纤长,在茎的下部长可达 14 厘米,绿色而带淡红褐色,边缘白色,顶端具长 15—23 毫米的略白舌片。穗状花序顶生,长约 2 厘米,具花 4—5 轮;花序梗短,长 25—35 毫米;花小,花柱短,柱头卵形。果实斜倒卵形,长约 3 毫米,宽约 2 毫米,背部钝圆而稍呈肋状,果喙呈短尖头状。

解剖特征:茎解剖特征与篦齿眼子菜 *P. pectinatus* 相似,但在叶中,本种机械束较