

形,长3—7厘米,宽1—1.5厘米,先端渐尖;浮水叶或挺水叶卵圆形、卵状椭圆形,长3—4.5厘米,宽3—3.5厘米,先端钝尖,基部浅心形;叶柄长12—22厘米。花葶直立,高约20厘米或更高。花1—3朵,着生于花葶顶部,苞片2枚,佛焰苞状,长约7毫米。花两性;外轮花被片3枚,绿色,广椭圆形,长约5毫米,先端钝圆;内轮花被片与外轮近等长,倒卵状椭圆形;心皮多数,密集于花托上,花柱顶生,长于心皮,宿存;雄蕊9枚,长约2.5毫米,花药椭圆形,花丝上下等宽;花托突起,呈柱状。果实多少侧扁,近倒三角形,顶端具喙,长约3—5毫米,基部宽约1.5—3毫米,向上渐尖呈芒状。花果期8—9月。

产浙江丽水四明山。生于池沼浅水中。越南、印度、马来西亚及非洲热带地区有分布。

本种在我国分布十分稀少,自1930年在浙江采到1号(No. 766)标本外,至今尚未采到。

3. 泽苔草属——*Caldesia* Parl.

Parl. in Nuov. Gen. e Spec. Monocot. 57. 1854, et Fl. Italiana

3: 598. 1858; Buch. in Engl. Pflanzenr. IV. 15: 15. 1903.

水生草本。根粗壮,或多少肉质,具匍匐根状茎,或无。叶多数,沉水、浮水或挺水;沉水叶通常较小,淡绿色;浮水叶较大,深绿色;挺水叶叶柄直立,叶片坚纸质或近革质。花葶直立,挺出水面,稀斜卧。花序圆锥状或圆锥状聚伞花序,分枝轮生,每轮3—6枚,基部具披针形苞片;花两性;花被片6枚,排成2轮,外轮萼片状,内轮花瓣状,大于外轮;心皮多数,分离,胀圆,或多少压扁;雄蕊6至多数,排成一轮。小坚果具脊,或有时脊不明显,果喙宿存,直立。

模式种: 泽苔草 *Caldesia parnassifolia* (Bassi ex Linn.) Parl.

全属共4种,分布于亚洲、欧洲、非洲及大洋洲。我国有2种,一种产长江以南及台湾,另一种南北均有分布。

供花卉观赏。

分种检索表

1. 叶片长大于宽,先端钝圆而不凹,中脉处不急尖,基部呈深心形,叶柄顶端无叶枕;雄蕊6枚……………1. 泽苔草 *C. parnassifolia* (Bassi ex Linn.) Parl.
4. 叶片宽大于长,先端呈凹形,中脉处急尖凸起,基部平直,稀多少下延,不呈心形,叶柄顶端呈叶枕状;雄蕊9—12枚……………2. 宽叶泽苔草 *C. grandis* Samuel.

1. 泽苔草 图版 54: 15—16

Caldesia parnassifolia (Bassi ex Linn.) Parl. in Nuov. Gen. e Spec. Monocot. 57. 1854; Buch. in Engl. Pflanzenr. IV. 15: 15—16. 1903; Juz. in Kom. Fl.