

状伞形花序顶生,具苞片3枚;花多数,两性;花被片6枚,宿存,2轮排列,外轮3枚萼片状,较小,绿色,内轮3枚花瓣状,粉红色;雄蕊9枚,分离,花药底着,2室,纵裂;心皮6枚,通常基部联合成一环,子房内胚珠多数,着生于心皮的内壁。果为蓇葖果,具顶生长喙。种子具沟纹;胚直立。

模式种: 花蔺 *Butomus umbellatus* Linn.

本属仅1种,产我国长江以北各省区。生于沼泽、水边或浅水塘中。分布于亚洲、欧洲和非洲南部。

1. 花蔺(中国种子植物名称) 菰(救荒本草) 图版 56

Butomus umbellatus Linn., Sp. Pl. 372. 1753; Buch. in Engl. Pflanzenr. 16 (IV 16): 6. 1903; Wright in Journ. Linn. Soc. Bot. 36: 191. 1903; 华东水生维管束植物 20. 图 26. 1952; Steward, Manual Vascul. Pl. Lower Yangtze Val. China 426. 1958; 中国高等植物图鉴 5: 21. 图 6871. 1976; Kitagawa, Lineam. Fl. Manschur. 62. 1979.

多年生水生草本,通常成丛生长。根茎横走或斜向生长,节生须根多数。叶基生,长30—120厘米,宽3—10毫米,无柄,先端渐尖,基部扩大成鞘状,鞘缘膜质。花葶圆柱形,长约70厘米;花序基部3枚苞片卵形,先端渐尖;花柄长4—10厘米;花被片外轮较小,萼片状,绿色而稍带红色,内轮较大,花瓣状,粉红色;雄蕊花丝扁平,基部较宽;雌蕊柱头纵折状向外弯曲。蓇葖果成熟时沿腹缝线开裂,顶端具长喙。种子多数,细小。花果期7—9月。

产东北、内蒙古、河北、山西、陕西、新疆、山东、江苏、河南、湖北等地。生于湖泊、水塘、沟渠的浅水中或沼泽里。也分布于亚洲、欧洲及其他地区。

2. 拟花蔺属——*Butomopsis* Kunth

Kunth, Enum. Pl. 3: 164. 1841. — *Tenagocharis* Hochst. in Flora 24: 369. 1841.


一年生沼生草本,植株有乳汁。叶基生;叶片椭圆形或椭圆状披针形,具柄,柄基鞘状。花葶直立;伞形花序顶生,基部具佛焰苞状苞片3枚;花两性;花被片6枚,2轮排列,外轮3枚萼片状,边缘膜质,宿存,内轮3枚花瓣状,早萎;雄蕊通常9枚,花丝基部稍宽;心皮6—9枚,轮生,无柄,胚珠多数,散生于网状分枝的侧膜胎座上。蓇葖果沿腹缝线开裂。种子呈钩状弯曲;胚马蹄形。

模式种: 拟花蔺 *Butomopsis latifolia* (D. Don) Kunth

本属仅1种,产云南。分布于大洋洲、亚洲热带及北部非洲。

1. 拟花蔺(中国高等植物图鉴)

Butomopsis latifolia (D. Don) Kunth, Enum. Pl. 3: 165. 1841. — *Butomus*



1—3.花蔺 *Butomus umbellatus* Linn.: 1.植株, 2—3.果实。(陈宝联绘)