

内层冠毛刚毛羽毛状，外层冠毛刚毛锯齿状或糙毛状，或全部冠毛刚毛羽毛状。

模式：Hypochaeris L.

本亚族在我国有3属。

197. 猫儿菊属 *Hypochaeris* L.

L., Sp. Pl. 810. 1753 et Gen. Pl. ed. 5. 352. 1754; Benth. et Hook. f., Gen. Pl. 2: 519. 1873. — O. Hoffm. in Engler et Prantl, Pflanzenfam. 4(5): 361. 1893. — *Achyrophorus* Scop., Fl. Carniol. ed. 2. 2: 116. 1772.

多年生草本，极少一年生。茎单生，不分枝或少分枝，有叶或无叶，有基生的莲座状叶丛。头状花序大或中等大小，卵状、宽半球形或钟形，植株含1—3个头状花序，单生茎顶或枝端，有多数同形两性舌状小花。总苞片多层，覆瓦状排列。花托平，有托片，托片长膜质，线形，基部包围舌状小花。全部小花舌状，两性、结实，黄色，舌片顶端截形，5齿裂。花药基部箭形，花柱分柱纤细，顶端微钝。瘦果圆柱形或长椭圆形，有多条高起的纵肋，或纵肋少数，顶端有喙，喙细或短，或顶端截形而无喙。冠毛羽毛状，1层。

模式：Hypochaeris maculata L.

约60种，主要分布南美洲；欧洲与亚洲有少数种。我国有2种。

分种检索表

1. 外层总苞片线状披针形，背面被长硬毛；茎分枝，植株含1—3个头状花序；头状花序生茎枝顶端 1. 新疆猫儿菊 *H. maculata* L.
1. 外层总苞片卵形或长椭圆状卵形，背面被软卷毛；茎不分枝，植株含1个头状花序；头状花序单生茎端 2. 猫儿菊 *H. ciliata* (Thunb.) Makino

1. 新疆猫儿菊 图版14: 3—5

Hypochaeris maculata L., Sp. Pl. 810. 1753; Ledeb., Fl. Alt. 4: 164. 1833. — *Achyrophorus maculatus* (L.) Scop., Fl. Carniol. 2: 116. 1772; DC., Prodr. 7: 92. 1838; Ledeb., Fl. Ross. 2: 776. 1845—1846; V. Vassil. in Fl. URSS 29: 202. 1964.

多年生草本，高30—120厘米。根垂直直伸，根颈被黑褐色残存的叶柄。茎直立，不分枝，全长被稠密或稀疏开展的白色长硬毛。基生叶莲座状，椭圆形、长倒披针形、宽披针形、几卵形或匙形，向基部渐狭成短翼柄，包括翼柄长7—14厘米，宽2.5—3.5厘米，顶端圆钝或急尖，两面被白色短硬毛；茎生叶1枚，长椭圆形或披针形，顶端急尖