

昆明市售作草药，润肺止咳、清热解毒、消食理气。

15. 果山还阳参（云南种子植物名录）

Crepis bodinieri Lév. in Bull. Acad. Géogr. Bot. **25**: 15. 1915; Babcock in Univ. Calif. Publ. Bot. **22**: 638. 1947; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **19** (3—4): 220. 1966; Lauener in Notes Royal Bot. Gard. Edinb. **34**: 387. 1976; 云南种子植物名录，下册，1364. 1984.

多年生草本，高40—50厘米。根木质，垂直直伸或扭曲或弯曲，粗厚，分枝。茎直立，多数或少数，绿色、黑绿色或带紫红色，下部木质，上部伞房花序状分枝，全部茎枝无毛。基部茎叶极小，线钻形或苞片状，中上部叶质叶柔软，线形或狭线形，长2—14厘米，宽0.1—1.5厘米，顶端急尖或渐尖，基部无柄，边缘全缘，反卷，最上部茎叶及头状花序分枝处与花序梗上的叶小或极小，通常钻形，全部叶两面无毛。头状花序多数或少数在茎枝顶端排成伞房状花序。总苞钟状，长8—9毫米；总苞片4层，外层与最外层最小，线形或线状披针形，长达2毫米，宽不足0.4毫米，顶端急尖，内层及最内层长披针形，长8—9毫米，宽约1毫米，顶端钝，顶端沿边缘有白色绒毛，内面无毛；全部总苞片外面被稀疏的蛛丝状毛或无毛。舌状小花黄色，花冠管外面无毛。瘦果纺锤状，长4毫米，向顶端渐细，顶端无喙，褐色，有12条几等粗纵肋，肋上无小刺毛或刺毛不明显。冠毛白色，长4毫米。 花果期6—7月。

分布云南（昆明、思茅、丽江、中甸）、四川（越西）、西藏（察隅）。生于山坡林下或灌丛中，海拔1 600—2 900米。模式标本采自云南（昆明）。

16. 还阳参（滇南本草）

Crepis rigescens Diels in Notes Royal Bot. Gard. Edinb. **5**: 202. 1912; Hand. -Mazz., Symb. Sin. **7**: 1184. 1936; Babcock in Univ. Calif. Publ. Bot. **22**: 640. 1947; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **19** (3—4): 228. 1966; 中国高等植物图鉴4: 699. 图6811. 1975. — *C. rigescens* Diels subsp. *typica* Babcock in Univ. Calif. Publ. Bot. **22**: 642. 1947. syn. nov.; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **19** (3—4): 228. 1966. — *C. rigescens* Diels subsp. *lignesens* Babcock in Univ. Calif. Publ. Bot. **22**: 643. 1947. syn. nov.; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **19** (3—4): 228. 1966.

多年生草本，高20—60厘米。根木质，粗或细，不分枝或分枝。茎直立，近基部圆柱状，基部木质，自上部或自中部以上分枝。基部茎叶极小，鳞片状或线钻形；中部茎叶线形，长3—8厘米，宽0.5—5毫米，质地坚硬，顶端急尖，基部无柄，边缘全缘，反卷，两面无毛。头状花序直立，多数或少数，在茎枝顶端排成伞房状花序。总苞圆柱状至钟状，长8—9毫米；总苞片4层，外层及最外层小，不等长，长达3毫米，宽1毫米或不足1毫米，线形或披针形，顶端急尖，内层及最内层披针形或椭圆状披针形，长7—9毫米，宽1毫米，顶端急尖，边缘白色膜质，内面无毛；全部总苞片外面被白色蛛丝状