

组2. 总序组 Sect. *Stenophytum* Babcock et Stebbins in Carnegie Inst. Washington Publ. **484**: 25. 1937.

多年生草本，有明显主茎。头状花序排成总状花序或狭圆锥状总状花序。含11—14枚舌状小花。叶不分裂。

组模式：Y. *stenoma* (Turcz.) Ledeb.

6. 总序黄鹌菜 旌节黄鹌菜（西藏植物志），高山黄鹌菜（云南种子植物名录）

Youngia racemifera (Hook. f.) Babcock et Stebbins in Univ. Calif. Publ. Bot. **18**: 229. 1943 et **22**: 926. 1947; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **22** (1—2): 35. 1969; Kitam. et al., Enum. Flowering Plant Nepal **3**: 449. 1982; 西藏植物志 **4**: 968. 1985; Shih in Vasc. Pl. Hengduan Mts. vol. **2**: 2139. 1994——*Crepis racemifera* Hook. f., Fl. Bit. Ind. **3**: 397. 1883; Hand.-Mazz., Symb. Sin. **7**: 1183. 1936 et in Act. Hort. Gothob. **12**: 354. 1938. ——*Hieracioides racemiferum* (Hook. f.) O. Ktze., Gen. Pl. **1**: 346. 1891. ——*Crepis rapunculoides* Dunn. in Journ. Linn. Soc. Bot. **35**: 512. 1903.

多年生草本，高20—50厘米。根垂直直伸或歪斜，生多数须根。茎直立，单生，有不明显的细条纹，基部直径1.5—3毫米，下部或有时大部紫红色，通常不分枝或有时自中下部有长而斜升的分枝。全部茎枝无毛。基生叶及下部茎叶心形、箭头状心形、卵形或椭圆形，长2—5厘米，宽1.5—3厘米，顶端渐尖或急尖，基部心形、宽楔形或平截，边缘有小尖头或小锯齿，叶柄长3—9厘米，有狭或宽翼；中上部茎叶渐小，长卵形、披针形、长披针形或狭线形，顶端渐尖或长渐尖，边缘有小尖头或微齿或无小尖头亦无微齿，接花序分枝及接头状花序下部的叶长线钻形或短线钻形；全部叶两面无毛。头状花序较大，下垂、下倾或直立，少数沿茎或沿分枝排成侧向总状花序，含14枚舌状小花，花序梗弯曲或直立。总苞狭钟状，长1.3—1.4厘米，黑绿色或绿色；总苞片4层，外层及最外层极短，长三角形或披针形，长2—3毫米，宽约1毫米，顶端钝或急尖，内层及最内层长，长披针形，长1.3—1.4厘米，宽约1.5毫米，顶端急尖或钝；全部总苞片外面无毛或有时外面沿中脉，特别在基部有极稀疏的多细胞长节毛。瘦果黄褐色，纺锤形，稍压扁，长4.5毫米，有14条粗细不等的纵肋，顶端截形，无喙。冠毛黄褐色，长约7毫米。花果期8—9月。

分布云南（屏边、中甸）、四川（康定、安宁、道孚、木里、盐源、雅江、汶川）、西藏（察隅、波密、米林、工布江达）。生于山坡草地、云杉林缘及林下，海拔2 800—3 600米。尼泊尔、不丹、锡金有分布。模式标本采自锡金。

7. 碱黄鹌菜 图版32: 1—2

Youngia stenoma (Turcz.) Ledeb., Fl. Ross. **2**: 837. 1845—1846; Babcock et Stebbins in Carnegie Inst. Washington Publ. Bot. **484**: 42. 1937 et in Univ. Calif. Publ.