

(雷山、德江)、云南(思茅、蒙自、元阳、凤庆、金平)。生山谷水旁潮湿处、山坡草地、疏林或灌丛中,海拔600—3 000米。中南半岛及印度有分布。模式标本采自云南思茅。

12. 纤细黄鹌菜 细黄鹌菜 (云南种子植物名录)

Youngia stebbinsiana S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **22** (1—2): 37. 1969. ———*Y. gracilis* Hook. f. ex Benth. et Hook. f., Gen. Pl. **2**: 514. 1873. nom. nud. ———*Crepis gracilis* Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 254. 1876. ———*C. atripappa* Babcock in Univ. Calif. Publ. Bot. **14**: 324. 1928. ———*Youngia gracilis* (Hook. f. et Thoms. ex C. B. Clarke) Babcock et Stebbins in Carnegie Inst. Washington Publ. **484**: 67. 1937. non Miq. 1861; Babcock in Univ. Calif. Publ. Bot. **22**: 922. 1947; 西藏植物志 **4**: 968. 1985.

多年生草本,高20—50厘米。根状茎细,生多数须根。茎直立,单生,细或稍粗,基部直径1—2毫米,上部伞房或伞形花序分枝,极少不分枝,全部茎枝无毛。基生叶及中下部茎叶不裂,倒披针形、披针形、椭圆形或椭圆状披针形,包括柄或翼柄长1.5—11厘米,宽2—4厘米,顶端渐尖或长渐尖或圆形,基部楔形收窄,无柄,或渐狭成有翼柄的柄或急狭成柄,边缘有稀疏的小尖头或边缘有稀疏的凹浅齿或圆齿,顶端有小尖头,或叶片上半部不裂,边缘有波状浅齿或圆齿,下半部倒向羽状半裂,裂片三角形或椭圆形,顶端急尖、钝或圆形;上部茎叶披针形或长披针形或椭圆形,长3.5—8厘米,宽0.5—2.5厘米,顶端急尖或长渐尖,基部渐狭,无柄或近无柄;接头状花序分枝下部或花序梗基部的叶线形、狭线形或钻形,小。全部叶上面被微糙毛。头状花序小,3—6个在茎枝顶端排成伞房或伞形状花序,但上的叶腋处常有1个具长花序梗的头状花序。总苞圆柱状,长8—9毫米;总苞片4层,外层及最外层极短,宽卵形或椭圆形,长宽各1毫米,顶端钝或急尖,内层及最内层长,披针形,长8—9毫米,宽1毫米或过之,顶端急尖或钝,边缘膜质,全部总苞片内外面无毛。舌状小花15枚,黄花,花冠管外面有短柔毛。瘦果纺锤状,黑色,长3.5毫米,向顶渐窄,顶端无喙,有12—14条粗细不等的纵肋,肋上有小刺毛。冠毛鼠灰色,纤细,长4毫米,糙毛状。花果6—8月。

分布四川(合川、峨眉)、云南(贡山)、西藏(波密、林芝、错那)。生于山坡林缘、林下及灌丛中,海拔900—3 000米。锡金及印度东北部有分布。模式标本采自锡金。

13. 厚绒黄鹌菜 褐黄鹌菜 (云南种子植物名录) 图版34: 1—2

Youngia fusca (Babcock) Babcock et Stebbins in Carnegie Inst. Washington Publ. **484**: 76. 1937; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **22** (1—2): 32. 1969; Lauener in Notes Royal Bot. Gard. Edin. **34**: 389. 1976; 云南种子植物名录, 1448, 1984; 贵州植物志 **9**: 375, 1989. ———*Crepis blinii* Lévl. in Bull. Acad. Géogr. Bot. **25**: 15. 1915 et Cat. Pl. Yunnan 43. 1915. non *C. blinii* Lévl. 1914. ———*C. fusca* Babcock in Univ. Calif. Publ. Bot. **14**: 327. 1928; Hand.-Mazz., Symb. Sin. **7**: 1185. 1936.