

个种的标本，现将其文献及记载抄整如下：

1) *Youngia bifurcata* Babcock et Stebbins in Carnegie Inst. Washington Publ. **484**: 89. 1937; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **22** (1—2): 30. 1969. — *Crepis bifurcata* (Babcock et Stebbins) Hand. -Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr. **88**: 312. 1939.

多年生草本，高12—13厘米。茎少数，细，有着生1—2个头状花序的少数长分枝，茎基短，生有1个长而水平伸延的匍匐茎。基生叶全形倒披针形，长达10厘米，宽2厘米，大头羽状深裂，顶裂片卵形或椭圆形，边缘全缘或稀疏的微波状，顶端钝凹缺，侧裂片倒向，排列较紧密，半圆形或三角形，向下的侧裂片逐渐变小，边缘全缘或乳突状微齿，叶柄短，有翼，叶两面被褐色多细胞节毛；花茎上的叶极小，苞片状。头状花序少数，在茎枝顶端排成伞房状花序，花序梗长1.5—4.5厘米，细，被多细胞节毛。总苞圆柱状，长6—7毫米；总苞片4层，外层短，卵形，长1—2毫米，顶端急尖或钝，内层及最内层长，披针形，长6—7毫米，顶端急尖，内面被贴伏的细糙毛。舌状小花黄色，约12枚，花冠管被稠密的针状毛。瘦果黑红褐色，纺锤状，压扁，长3—3.5毫米，向顶端渐狭，顶部无喙，有12—14条粗细不等的纵肋，肋上有小刺毛。冠毛白色，微糙。

模式标本采自云南东川。

## 25. 川黔黄鹌菜

*Youngia rubida* Babcock et Stebbins in Carnegie Inst. Washington Publ. **484**: 100. 1937; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **22** (1—2): 36. 1969.

一年生草本，高20—50厘米。根细，生多数须根。茎直立，自基部分枝，下部特别在节上有多细胞节毛，上部脱毛或无毛。基生叶全形倒披针形，长3—7厘米，宽1.5—3厘米，大头羽状深裂或全裂，有长3—3.5厘米的叶柄，顶裂片狭窄，三角形，顶端渐尖，有小尖头，边缘有锯齿，侧裂片2—3对，椭圆形或长椭圆形，边缘有不明显锯齿，最下部的侧裂片锯齿状；中下部茎叶与基生叶同形并等样分裂；上部茎叶宽线形，基部渐狭，无柄，边缘全缘或少锯齿，顶端急或渐尖；接花序分枝枝叉上的叶钻形或线钻形，极小；全部叶两面无毛。头状花序含13—15枚舌状小花，多数在茎枝顶端排成伞房圆锥花序。总苞圆柱状，长6.5毫米；总苞片4层，外层及最外层极短，卵形，长宽不足1毫米，顶端急尖，内层及最内层长，披针形，长6.5毫米，宽1毫米，顶端急尖或钝，边缘白色膜质，内面有贴伏的细糙毛。舌状小花黄色，花冠管外面被稠密长绒毛。瘦果纺锤形，红色，长2.8毫米，顶端收窄成粗短的喙状物，有12条粗细不等的纵肋，沿肋有小刺毛。冠毛白色，糙毛状，长3.5毫米。 花果期4—10月。

分布湖南（安江）、四川（重庆、普格、天全、成都、城口）、贵州（罗甸、册亨）。生于山坡林缘、林下、岩石下或土壁上。模式标本采自贵州册亨。

## 26. 戟叶黄鹌菜 图版37: 3

*Youngia longipes* (Hemsl.) Babcock et Stebbins in Carnegie Inst. Washington Publ.