

柱状，向基部稍收窄，向顶端增粗，顶端圆形，无喙，有15条等粗的细纵肋。冠毛5—10层，白色，等长，基部连合成环，整体脱落。单种属，分布甘肃与新疆。

1. 河西菊 图版9: 3—4

Hexinia polydichotoma* (Ostenf.) H. L. Yang in Fl. Desert. Republ. Popul. Sin. 3: 459. 1992. — *Chondrilla polydichotoma* Ostenf. in Hedin, South. Tibet 6 (3): 29. 1922; Ling in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping 3: 206. 1935; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 19 (1—2): 23. 1966. — *Scorzonera divaricata* auct. non Turcz.: 中国高等植物图鉴4: 674. quoad fig. 6762, 1985. — *S. muriculata* auct. non Chang: 石铸, 植物分类学报25 (1): 40. 1987.

多年生草本，高15—40 (50) 厘米。根颈不被纤维状叶鞘残遗物，自根茎发出多数茎。茎自下部起多级等二叉状分枝，形成球状，全部茎枝无毛。基生叶与下部茎叶少数，线形，革质，无柄，长0.5—4厘米，宽2—5毫米，基部半抱茎，顶端钝；中部茎与上部茎叶或有时基生叶退化成小三角形鳞片状。头状花序极多数，单生于末级等二叉状分枝末端，花序梗粗短，含4—7枚舌状小花。总苞圆柱状，长8—10毫米；总苞片2—3层；外层小，不等长，长2—4毫米，三角形或三角状卵形，内层长椭圆形或长椭圆状披针形，长8—10毫米；全部总苞片顶端急尖或钝，外面无毛。舌状小花黄色，花冠管外面无毛。瘦果圆柱状，淡黄色至黄棕色，长约4毫米，向顶端增粗，顶端圆形，无喙，向下稍收窄，有15条等粗的细纵肋。冠毛白色，5—10层，长7—8毫米，单毛状，基部连合成环，整体脱落。花果期5—9月。

分布甘肃（兰州、安西、酒泉、金塔）、新疆（若羌、乌恰、叶城、于田、疏附、阿克苏、吐鲁番、轮台、托克逊、尉犁）。生于沙地、沙地边缘、沙丘间低地、戈壁冲沟及沙地田边，海拔—42—1 800米。

208. 假还阳参属** *Crepidiastrum* Nakai

Nakai in Bot. Mag. Tokyo 34: 147. 1920; Hara, Enum. Sperm. Jap.

2: 188. 1952; Kitam. in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto ser. B. 22:


105. 1955. — *Ixeris* Cass. subgen. *Crepidiastrum* (Nakai) Stebbins

in Journ. Bot. Brit. For. 75: 45. 1937.

半灌木或多年生草本。茎生叶集中于枝端或互生，基生叶莲座状，全部叶不分裂或羽状浅裂，有叶柄。头状花序同型，舌状，含多数舌状小花，多数头状花序排成伞房状

* 早在1930年，Iljin在对粉苞菊属的订正研究中就把 *Chondrilla Polydichotoma* Ostenf. 组合成 *Zollikoferia Polydichotoma* (Ostenf.) Iljin. 由于作者从吴征镒教授获得此信息时，校样业已印出。因此，这里就不便进行改动了。特此说明。

** 假黄鹌菜属（台湾植物志）。



图版9 1—2. 皱叶鸦葱 *Scorzonera inconspicua* Lipsch. ex Pavl.: 1. 植株; 2. 瘦果。3. 河西菊 *Hexinia polydichotoma* (Ostenf.) H. L. Yang: 3. 植株; 4. 瘦果。(王金凤绘)