

舌片顶端5齿裂。瘦果钝圆柱状，有4条大而钝的纵肋，长3.8毫米，浅青褐色，有横皱纹。冠毛白色，纤细，长6毫米。花果期6—12月。

分布海南（琼山、陵水、崖县、昌江、东方、西沙永兴岛）。生于海滨沙地、空旷处。斯里兰卡、印度、埃及和非洲西部及中南半岛有分布。

## 210. 花佩菊属 *Faberia* Sch.-Bip.

Sch.-Bip. in Nov. Act. Nat. Cur. **21**: 129. 1845. Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**: 479. 1888; O. Hoffm. in Engler et Prantl, Pflanzenfam. **4** (5): 373. 1894; Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève II. **2**: 50. 1910; *Lactuca* L. sect. *Faberia* (Hemsl.) Franch. in Journ. de Bot. **9**: 294. 1901.

多年生葶状草本。叶大头羽状分裂或不裂，质地厚。头状花序稍大，同型，舌状，含多数舌状小花。总苞钟状，压扁后成楔形；总苞片3—5层，自外层向中层渐长，覆瓦状排列，内层最长，或外层及最外层最短，最内层最长，呈或不呈覆瓦状排列。花托平或稍突起，无托毛。全部小花紫红或淡蓝色，两性，舌片顶端截形，5齿裂或中裂片舌状顶端3齿裂，两侧各有1个全裂达基部的线形侧裂片；花药基部附属物尖耳状或箭头形，花柱分枝细长，有乳突或小刺毛。瘦果长椭圆形，扁压，每面有7—10条纵肋或脉纹，有小刺毛，顶端截形，无喙。冠毛褐色或淡黄白色，或红色，1—3层，等长，糙毛状。

分布我国云南、四川、贵州。根据文献记录，我国有7种，现知4种。

模式：*Faberia sinensis* Hemsl.

## 分种检索表

1. 叶不分裂。
  2. 基生叶长卵形或心形 ..... 1. 卵叶花佩菊 *F. tsiangii* (Chang) Shih
  2. 基生叶线状长椭圆形 ..... 2. 狭叶花佩菊 *F. nanchuanensis* Shih
1. 叶大头羽状分裂或植株至少含有大头羽状分裂的叶。
  3. 叶柄及叶下面被稠密的棕色多细胞长节毛 ..... 3. 花佩菊 *F. sinensis* Hemsl.
  3. 全株光滑无毛 ..... 4. 光滑花佩菊 *F. tibetica* (Franch.) Beauverd

### 1. 卵叶花佩菊

*Faberia tsiangii* (Chang) Shih, comb. nov. — *Hieracium tsiangii* Chang in Sinensia **3**: 207. 1933; S. Y. Hu in Quart. Journ. taiwan Mus. **19** (3—4): 292. 1966.

多年生草本，高62厘米。茎细，通常紫色，无毛，顶端圆锥状花序分枝。基生叶长