

porphyrea (Marq. et Shaw) Stebbins in Mem. Torrey Bot. Club **19** (3): 49. 1940; Babcock in Univ. Calif. Publ. Bot. **22**: 922. 1947; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **20** (1-2): 25. 1967]. 总苞片1层, 4—5枚; 花冠紫色。标本未见。

215. 肉菊属 *Stebbinsia* Lipsch.

Lipsch. in 75th Anniv. Vol. Sukatsch. 361. 1956.

多年生肉质植物, 茎极短缩。全部叶全为基生, 暗紫红色。头状花序同型, 舌状, 多数在茎端莲座状叶丛中集成团伞状花序, 花梗等长。总苞圆柱状; 总苞片3层, 近等长, 10—15枚, 长椭圆形。小苞片2枚, 线形。舌状小花黄色, 15—40枚。花柱分枝细, 顶端钝, 花药基部附属短尾状。瘦果近长圆柱状, 棕黄色, 长弧曲, 顶端无喙, 有14条粗细不等的纵肋。冠毛白色或浅棕黄色, 细锯齿状, 分散脱落。

单种属, 分布我国四川、云南及西藏。

1. 肉菊 伞花绢毛菊 (中国高等植物图鉴) 条参

Stebbinsia umbrella (Franch.) Lipsch. in 75th Anniv. Vol. Sukatsch. 362. 1956. — *Crepis umbrella* Franch. in Journ. de Bot. **9**: 255. 1905; Hand. -Mazz., Symb. Sin. **7**: 1185. 1936 et in Act. Hort. Gothob. **12**: 356. 1938. — *Soroseris umbrella* (Franch.) Stebbins in Mem. Torrey Bot. Club **19** (3): 33. 1940; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **21** (3-4): 167. 1968; 中国高等植物图鉴 **4**: 687. 图6788. 1975; 西藏植物志 **4**: 940. 1985; Shih in Act. Phytotax. Sin **31**: 450. 1993.

多年生肉质草本, 高3—15厘米。根垂直直伸, 圆柱状, 直径1厘米。茎极短缩, 无毛, 直径约1厘米。叶稠密, 莲座状, 紫红色, 外围的叶较大, 贴近团伞花序下部的较小, 卵形、卵圆形或卵状椭圆形, 长3.5—8厘米, 宽3—7厘米, 顶端圆形, 基部圆形或浅心形, 叶柄宽厚, 无翼或有狭翼, 长4—11厘米, 边缘有稀疏的小尖头或细尖齿, 两面及叶柄被稀疏的棕黄色的长或短硬毛。头状花序多数, 在茎顶莲座状叶丛中密集成团伞花序, 含10—25枚舌状小花, 花序梗粗, 几等长, 长2.5—4厘米, 被稀疏的长或短硬毛, 小苞片2枚, 线形, 长约1.3厘米, 宽约1毫米, 边缘及外面被稀疏长硬毛, 总苞圆柱状; 总苞片3层, 10—15枚, 几等长, 长1.4—1.6厘米, 宽3—5毫米, 长椭圆形, 顶端急尖或钝, 干后黑色或黑绿色, 外面或外面沿中脉被稠密或稀疏长硬毛。舌状小花黄色, 舌片顶端截形, 5齿裂。瘦果近长圆柱状, 棕黄色, 常弯曲, 顶端无喙, 长6毫米, 宽1.5毫米, 有14条粗细不等的细纵肋。冠毛3—(4)层, 细锯齿状, 长约10毫米。花果期7—9月。

分布四川 (康定、道孚)、云南 (丽江、中甸、德钦)、西藏 (察隅)。生于高山草甸及流石滩, 海拔2 600—4 600米。模式标本采自四川康定。