

216. 稻槎菜属 *Lapsana* L.

L., Sp. Pl. 811. 1753, ed. 2, 1141. 1754 et Gen. Pl. ed. 5. 353.
 1754; DC., Prodr. 7: 76. 1838; Benth. et Hook. f., Gen. Pl. 2:
 509. 1873; O. Hoffm. in Engler et Prantl, Pflanzenfam. 4 (5): 357.
 1893.

一年生或多年生草本。叶边缘有锯齿或羽状深裂或全裂。头状花序同型，舌状，小，含8—15枚舌状小花，在茎枝顶裂排列成疏松的伞房状花序或圆锥状花序。总苞圆柱状钟形或钟形；总苞片2层，外层小，3—5枚，卵形，内层长，线形或线状披针形。花托平，无托毛。舌状小花黄色，两性。瘦果稍压扁，长椭圆形、长椭圆状披针形或圆柱状，但稍弯曲，有12—20条细小纵肋，顶端无冠毛。

约10种，分布欧亚温带地区及非洲西北部。我国记载4种，其中2种情况不详。

模式：*Lapsana communis* L.

分种检索表

1. 内层总苞片椭圆状披针形，先端喙状；瘦果顶端两侧各有1条钩刺状附属物
 1. 稻槎菜 *L. apogonoides* Maxim.
 1. 内层总苞片卵形，顶端尾尖；瘦果顶端无钩刺状附属物
 2. 矮小稻槎菜 *L. humilis* (Thunb.) Makino
 1. 稻槎菜 图版2: 3—4

Lapsana apogonoides Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 18: 288. 1873 et in Mém. Biol. 9: 20. 1873; Franch., Pl. David. 1: 185. 1884; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 185. 1888; Nakai. Fl. Sylv. Kor. 14: 115. 1923; Ling in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping 3: 181. 1935; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1177. 1936; Kia, Pl. Sin Ill. 65. fig. 116, 1937; 裴鉴等，江苏南部种子植物手册893. 1959; Ohwi, Fl. Jap. 920. 1965; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan. Mus. 20 (1—2): 34. 1967; 中国高等植物图鉴4: 670. 图6753. 1975; 安徽植物志4: 629. 1991.

一年生矮小草本，高7—20厘米。茎细，自基部发出多数或少数的簇生分枝及莲座状叶丛；全部茎枝柔软，被细柔毛或无毛。基生叶全形椭圆形、长椭圆状匙形或长匙形，长3—7厘米，宽1—2.5厘米，大头羽状全裂或几全裂，有长1—4厘米的叶柄，顶裂片卵形、菱形或椭圆形，边缘有极稀疏的小尖头，或长椭圆形而边缘大锯齿，齿顶有小尖头，侧裂片2—3对，椭圆形，边缘全缘或有极稀疏针刺状小尖头；茎生叶少数，与基生