

纵肋，被短柔毛，上部渐狭成喙。冠毛纤细，白色，糙毛状，易脱落，等于或稍短于瘦果。花果期 6—9 月。

据文献记载，我国西藏地区有分布，但我们未见到这个种的标本。本种在俄罗斯、哈萨克斯坦以及高加索、地中海地区、伊拉克、巴基斯坦、伊朗广有分布。模式标本采自西亚。

223. 苦蕒菜属 *Ixeris* Cass.

Cass. in Bull. Soc. Philom. 173. 1821 et in Dict. Sci. Nat. **24**: 49. 1822; DC., Prodr. **7**: 151. 1838, p. p.; A. Gray in Mem. Am. Acad. n. s. **6**: 397. 1859, p. p.; Kitam. in Bot. Mag. Kyoto **35**: 280. 1935, p. p. et in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto ser. B. **23**: 105. 1956; Stebbins in Journ. Bot. Brit. For. **75**: 43. 1937. — *Lactuca* L. sect. *Ixeris* (Cass.) Benth. et Hook. f., Gen. Pl. **2**: 526. 1873. excl. syn.

一年生或多年生草本。基生叶花期生存。头状花序同型，舌状，含多数舌状小花（10—26 枚），多数或少数在茎枝顶端排成伞房状花序。总苞花期圆柱状或钟状，果期有时卵球形；总苞片 2—3 层，外层最短，内层最长。花托平，无托毛。舌状小花黄色，舌片顶端 5 齿裂。花柱分枝细，花药基部附属物箭头形。瘦果压扁，褐色，纺锤形或椭圆形，无毛，有 10 条尖翅肋，顶端渐尖成细喙，喙长或短，细丝状，异色。冠毛白色，2 层，纤细，不等长，微粗糙，宿存或脱落。

本属约 20 种，分布东亚和南亚。我国有 4 种。

模式：*Ixeris polycephala* Cass.

分种检索表

1. 叶基部不扩大抱茎。
 2. 叶圆形或椭圆形，边缘全缘 1. 圆叶苦蕒菜 *I. stolonifera* A. Gray
 2. 叶匙状倒披针形或舌形，边缘有锯齿到羽状分裂 2. 剪刀股 *I. japonica* (Burm. f.) Nakai
1. 叶基部扩大，箭头状半抱茎。
 3. 全部叶不分裂，边缘全缘 3. 苦蕒菜 *I. polycephala* Cass.
 3. 叶羽状深裂 4. 深裂苦蕒菜 *I. dissecta* (Makino) Shih

1. 圆叶苦蕒菜 图版 55: 1

Ixeris stolonifera A. Gray in Mem. Am. Acad. n. s. **4**: 396. 1859; Miq. in Ann.