

Mus. Lugd.-Bat. **2**: 191. 1866; Nakai in Bot. Mag. Tokyo **34**: 158. 1920; Kitam. in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto Ser. B. **23**: 123. 1956; Lauener in Notes Royal Bot. Gard. Edinb. **34**: 392. 1976. — *Lactuca stolonifera* (A. Gray) Benth. et Hook. f., Gen. Pl. **2**: 526. 1873; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. **19**: 533. 1874 et in Mém. Biol. **9**: 364. 1874; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**: 484. 1888; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Add. Ser. **10**: 150. 1912; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **20** (1—2): 29. 1967. — *L. nummularifolia* Lévl. et Vaniot in Fedde, Rep. Sp. Nov. **8**: 421. 1910.

多年生草本，根垂直直伸，生多数须根，有长匍匐茎，匍匐茎纤细，常有分枝，无毛。节上常生不定根。基生叶花期生存，与茎生叶全部都有长柄，叶柄长1—4厘米，叶片圆形或椭圆形，长1—3厘米，宽0.8—1.5厘米，边缘全缘或下部仅一侧有1个尖齿裂，基部圆形或平截，顶端钝或圆形，有微凹。头状花序少数，枝生或茎生2—3枚头状花序，成伞房状排列。总苞钟状，长8毫米。总苞片2—3层，外层极短，披针形，长近2毫米，宽约1毫米，顶端急尖，内层长，长椭圆状线形，长8毫米，宽1毫米，顶端急尖或钝，边缘白色膜质。舌状小花黄色，15—26枚。瘦果褐色，长椭圆形，长2.5毫米，宽0.8毫米，无毛，有10条高起的尖翅肋，顶端急尖成细喙，喙长1.5毫米，细丝状。冠毛刚毛不等长，白色，微糙，长4毫米。花期10月。

分布江西（庐山）。日本、朝鲜有分布。模式标本采自日本。

2. 剪刀股 沙滩苦苣菜

Ixeris japonica (Burm. f.) Nakai in Bot. Mag. Tokyo **40**: 575. 1926. — *Lapsana japonica* Burm. f., Fl. Ind 181. 1768. — *Prenanthes debilis* Thunb., Fl. Jap. 300. 1784. — *Chondrilla debilis* Poiret, Encycl. Meth. Bot. Suppl. **2**: 332. 1811. — *Youngia debilis* (Poiret) DC., Prodr. **7**: 194. 1838. — *Ixeris debilis* (Thunb.) A. Gray in Mem. Am. Acad. n. s. **6**: 397. 1859; Benth. Fl. Hongk 193. 1861; Miq. in Ann. Mus. Lugd.-Bat. **2**: 191. 1866; Nakai, Fl. Sylv. Kor. **14**: 114. 1923; Kitam. in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto Ser. B. **23**: 125. 1956; 中国高等植物图鉴 **4**: 703. 图 6819. 1975; 安徽植物志 **4**: 621. 1991. — *Lactuca debilis* (Thunb.) Benth. ex Maxim. in Bull. Acad. Sc. St. Pétersb. **19**: 533. 1874 et in Mém. Biol. **9**: 365. 1874; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**: 480. 1888, p. p.; Merr. in Sunyatsenia **1**: 44. 1930; Ling in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping **3**: 195. 1935; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **20** (1—2): 17. 19—76; 侯宽昭, 广州植物志 555. 1955. — *Ixeris japonica* (Burm. f.) Nakai f. *sinuata* Franch. et Sav., Enum. Pl. Jap. 270. 1875; Nakai in Bot. Mag. Tokyo **40**: 576. 1926. — *Lactuca debilis* (Thunb.) Benth. ex Maxim. var. *integra* O. Ktze., Rev. Gen. **1**: 349. 1891. — *Ixeris japonica* (Burn.

f.) Nakai f. *integra* (O. Ktze.) Nakai in Bot. Mag. Tokyo **40**: 575. 1926. — *I. japonica* (Burm. f.) Nakai f. *dissecta* Nakai in Bot. Mag. Tokyo **40**: 576. 1926. — *Lactuca trifida* Kitam. in Act. Phytotax. et Geobot. **1**: 58. 1932; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **20** (1—2): 31. 1967. — *Ixeris japonica* (Burm. f.) Nakai subsp. *litoralis* Kitam. in Act. Phytotax. et Geobot. **3**: 132. 1934; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **20** (1—2): 4. 1967. — *I. japonica* (Burm. f.) Nakai var. *salsuginosa* Kitag. in Bot. Mag. Tokyo **48**: 113. 1934; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **20** (1—2): 5. 1967. — *I. japonica* (Burm. f.) Nakai subsp. *salsuginosa* (Kitag.) Kitag., Lineam. Fl. Mansh. 454. 1939. — *I. debilis* (Thunb.) A. Gray subsp. *litoralis* (Kitam.) Kitam. in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto Ser. B. **23**: 126. 1956. — *Ixeris japonica* (Burm. f.) Nakai var. *litoralis* (Kitam.) H. L. Li, Fl. Taiwan **4**: 888. 1978.

多年草本。根垂直直伸，生多数须根。茎基部平卧，高12—35厘米，基部有匍匐茎，节上生不定根与叶。基生叶花期生存，匙状倒披针形或舌形，长3—11厘米，宽1—2厘米，基部渐狭成具狭翼的长或短柄，边缘有锯齿至羽状半裂或深裂或大头羽状半裂或深裂，侧裂片1—3对，集中在叶片的中下部，偏斜三角形或椭圆形，顶端急尖或钝，顶裂片椭圆形、长倒卵形或长椭圆形，顶端钝或圆形，有小尖头；茎生叶少数，与基生叶同形或长椭圆形或长倒披针形，无柄或渐狭成短柄；花序分枝上或花序梗上的叶极小，卵形。头状花序1—6枚在茎枝顶端排成伞房花序。总苞钟状，长14毫米，宽约7毫米；总苞片2—3层，外层极短，卵形，长2毫米，宽1.2毫米，顶端急尖，内层长，长椭圆状披针形或长披针形，长14毫米，宽2毫米，顶端钝，外面顶端有小鸡冠状突起或无小鸡冠状突起。舌状小花24枚，黄色。瘦果褐色，几纺锤形，长5毫米，宽1毫米，无毛，有10条高起的尖翅肋，顶端急尖成细喙，喙长2毫米，细丝状。冠毛白色，纤细，不等长，微糙，长6.5毫米。 花果期3—5月。

分布东北（具体地点不详）、浙江（杭州、永嘉、镇海）福建（具体地点不详）、河南（郑州）、广东（广州）。生于路边潮湿处及田边。日本、朝鲜有分布。模式标本采自日本。

3. 苦蕒菜 多头莴苣（广州植物志），多头苦蕒菜 图版1: 2

Ixeris polycephala Cass. in Dict. Sc. Nat. **24**: 50. 1822; DC., Prodr. **7**: 151. 1838; Kitam. in Bot. Mag. Tokyo **49**: 289. 1935 et Fauna et Fl. Nepal Himal. 261. 1955 et in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto Ser. B. **23**: 106. 1956; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. **12**: 352. 1938; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **20**: (1—2): 6. 1967; 中国高等植物图鉴 **4**: 705. 图6823, 1975; Kitam. et Gould in H. Hara et al., Enum. Fl. Pl. Nepal **3**: 31. 1982; 秦岭植物志 **1** (5): 417. 1985; Shih in Act. Phytotax. Sin. **31**: 536. 1993. — *Lactuca polycephala* (Cass.) Benth. in Benth. et