

俄罗斯西伯利亚及远东地区有分布。模式标本采自俄罗斯伊尔库茨克。

8. 精细小苦蕒

Ixeridium elegans (Franch.) Shih in Act. Phytotax. Sin. **31**: 543. 1993. — *Lactuca elegans* Franch. in Journ. de Bot. **9**: 262. 1895; Ling in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping **3**: 194. 1935; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. **20** (1—2): 19. 1967. — *Ixeris denticulata* (Houtt.) Stebbins subsp. *elegans* (Franch.) Stebbins in Journ. Bot. Brit. For. **75**: 48. 1937.

多年生草本，高 7—35 厘米。根垂直直伸，不分枝或有分枝。茎直立，自基部分枝或上部伞房状或伞房圆锥状花序状分枝，分枝纤细，全部茎枝无毛。基生叶长 3.5—6 厘米，宽 1—2 厘米，有长 1—3 厘米的叶柄，羽状或倒向羽状全裂，侧裂片 3—7 对，菱形、不规则菱形、或至少侧裂片中有不规则菱形的侧裂片或宽三角形，全部侧裂片边缘无锯齿，较小，基部急狭或渐狭，有翼柄或无翼柄，顶裂片与侧裂片同形，等大或几等大或更小；中下部茎叶与基生等样分裂或羽状深裂，比基生叶小，基部扩大，心形抱茎，侧裂片与基生叶的侧裂片等形或长椭圆形；上部茎叶与接花序分枝下部叶披针形或线状长椭圆形，通常不分裂，边缘全缘，极少羽状深裂，基部耳状扩大。头状花序小，含 12 枚舌状小花，多数或少数在茎枝顶端排成伞房或伞房圆锥花序。总苞圆柱状，长 6 毫米；总苞片 2 层，外层小，卵形，长宽不足 1 毫米，内层长，线状披针形，长 6 毫米，宽 1 毫米，外面顶端有时有鸡冠状突起，全部总苞外面基部沿中肋海绵质增厚。舌状小花黄色。瘦果黑色，稍压扁，长椭圆状，长 1 毫米，宽 0.75 毫米，有 10 条高起的钝肋，沿肋上部有微刺毛，上部渐狭长细喙，喙长 0.7 毫米，细丝状。冠毛白色，糙毛状，长 3 毫米。花果期 8—9 月。

分布山西（霍山）、陕西（华山、太白山）、甘肃（平凉、西固、文县）、河南（卢氏）、四川（城口、松潘、汶川）。生于山坡、路旁、河谷，海拔 1 150—1 900 米。模式标本采自四川城口。

9. 抱茎小苦蕒 苦碟子，抱茎苦蕒菜，苦蕒菜，秋苦蕒菜，盘尔草，鸭子食

Ixeridium sonchifolium (Maxim.) Shih in Act. Phytotax. Sin. **31**: 543. 1993. — *Prenanthes Sonchifolia* Bunge in Mem. Acad. Sci. St. Pétersb. Sav. Etrang **2**: 114. 1833. non willd. — *Youngia sonchifolia* Maxim., Prim. Fl. Amur. 180. 1859; Kitam. in Act. Phytotax. et Geobot. **11**: 129. 1942 et in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto Ser. B. **22**: 123. 1955; Lauener in Notes Royal Bot. Gard. Edinb. **34**: 390. 1976. — *Ixeris sonchifolia* (Bunge) Hance in Journ. Linn. Soc. Bot. **13**: 108. 1873; Nakai in Bot. Mag. Tokyo **34**: 154. 1920, as *I. sonchifolia* (Bunge) Nakai; Kitam. in Act. Phytotax. et Geobot. **6**: 236. 1937; 中国高等植物图鉴 **4**: 706. 图 6826, 1975; 秦岭植物志 **1**(5): 417. 1985 as *I. sonchifolia* Hance — *Lactuca denticulata* (Houtt.) Maxim.

var. *sonchifolia* (Bunge) Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. **19**: 530. 1874 et in Mém. Biol. **9**: 359. 1874. — *L. sonchifolia* (Bunge) Benth. et Hook. f. ex Debeaux, Fl. Tchef. **90**. 1876. — *L. senecio* Lévl. et Vaniot in Fedde, Rep. Sp. Nov. **8**: 140. 1910. p. p.; Nakai in Journ. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo **31**: 507. 1911. p. p. — *L. bungeana* Nakai, Fl. Kor. **2**: 56, 1911; Ling in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping **3**: 195. 1935. — *Ixeris denticulata* (Houtt.) Maxim. subsp. *sonchifolia* (Maxim.) Stebbins in Journ. Bot. Brit. For **75**: 48. 1937; Hand. -Mazz. in Act. Hort. Gothob. **12**: 353. 1938. — *Paraixeris sonchifolia* (Maxim.) Tzvel. in Fl. URSS **29**: 399. 1964. — *Prenanthes sonchifolia* auct. non Willd.; Bunge, Enum Pl. Chin. Bor. **40**. 1833. — *Ixeris denticulata* auct. non (Houtt.) Stebbins; 中国高等植物图鉴 **4**: 706. 图 6825. 1975.

多年生草本，高 15—60 厘米。根垂直直伸，不分枝或分枝。根状茎极短。茎单生，直立，基部直径 1—4 毫米，上部伞房花序状或伞房圆锥花序状分枝，全部茎枝无毛。基生叶莲座状，匙形、长倒披针形或长椭圆形，包括基部渐狭的宽翼柄长 3—15 厘米，宽 1—3 厘米，或不分裂，边缘有锯齿，顶端圆形或急尖，或大头羽状深裂，顶裂片大，近圆形、椭圆形或卵状椭圆形，顶端圆形或急尖，边缘有锯齿，侧裂片 3—7 对，半椭圆形、三角形或线形，边缘有小锯齿；中下部茎叶长椭圆形、匙状椭圆形、倒披针形或披针形，与基生叶等大或较小，羽状浅裂或半裂，极少大头羽状分裂，向基部扩大，心形或耳状抱茎；上部茎叶及接花序分枝处的叶心状披针形，边缘全缘，极少有锯齿或尖锯齿，顶端渐尖，向基部心形或圆耳状扩大抱茎；全部叶两面无毛。头状花序多数或少数，在茎枝顶端排成伞房花序或伞房圆锥花序，含舌状小花约 17 枚。总苞圆柱形，长 5—6 毫米；总苞片 3 层，外层及最外层短，卵形或长卵形，长 1—3 毫米，宽 0.3—0.5 毫米，顶端急尖，内层长披针形，长 5—6 毫米，宽 1 毫米，顶端急尖，全部总苞片外面无毛。舌状小花黄色。瘦果黑色，纺锤形，长 2 毫米，宽 0.5 毫米，有 10 条高起的钝肋，上部沿肋有上指的小刺毛，向上渐尖成细喙，喙细丝状，长 0.8 毫米。冠毛白色，微糙毛状，长 3 毫米。 花果期 3—5 月。

分布辽宁（铁岭、沈阳、大连）、河北（内丘、兴隆）、山西（太原、阳曲、娄烦、沁县、离山、垣曲、芮城、中阳、霍县、永济、晋城、五台、吕梁）、内蒙古（大青山）、陕西（靖边、安康、米脂、绥德、勉县）、甘肃（平凉、天水、兰州、武山、文县、通渭、合水）、山东（济南、青岛、烟台）、江苏（南京、淮安、南通）、浙江（杭州、昌化）、河南（潢川）、湖北（宣恩、巴东、宜昌）、四川（奉节、南川、成都）、贵州（正安）。生于山坡或平原路旁、林下、河滩地、岩石上或庭院中，海拔 100—2 700 米。朝鲜、日本有分布。模式标本采自北京。

全草入药，清热解毒，有凉血、活血之功效。

10. 刺株小苦荬