

沙漠植物志 3: 457. 1992.

多年生草本，高 40—100 厘米。茎直立，下部淡红紫色，有时被稀疏的刚毛及蛛丝状短柔毛，自基部或基部以上分枝，分枝细，无毛。下部茎叶披针形，长 7.5—8.5 厘米，宽约 1 厘米，无毛，早枯；中部和上部茎叶狭线形至披针形，长 0.3—2.5 厘米，宽 0.3—1.5 (2) 毫米，无毛，全缘。头状花序果期长 15—17 毫米。外层总苞片小，宽卵形，长 1—2 毫米，宽不足 0.5 毫米，内层总苞片 5—6 (7) 枚，长椭圆状线形，长 11—14 毫米，宽约 1.5 毫米，外面有稀疏蛛丝状柔毛。舌状小花 5—6 枚，黄色。瘦果长 5—8 毫米，宽约 1 毫米，上部有 1—2 (3) 行鳞片状突起，稀无突起，冠鳞 5 枚，短，3 深裂，裂齿等长，喙长 0.5—1.5 (2) 毫米，无关节，顶端扩大。冠毛白色，长 7—9 毫米。花果期 5—9 月。

分布新疆（哈巴河、布尔津）。生于砾石草原，海拔 900—1 700 米。俄罗斯（欧洲部分、西伯利亚）、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦有分布。模式标本采自阿尔泰山。

10. 沙地粉苞菊 图版 26: 2—3

Chondrilla ambigua Fisch. ex Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. **15**: 398. 1842; Ledeb., Fl. Ross. **2**: 809. 1845—1846; Leonova in Fl. URSS **29**: 580. 1964.

多年生草本，高 40—100 厘米，无毛，下部有时淡紫色，自基部以上分枝。下部茎叶线状披针形或披针形，长 3—7 厘米，宽约 2.5 毫米，边缘全缘或有个别锯齿；中部及上部茎叶线状丝形或丝形，长 0.5—2 (7) 厘米，宽 1—1.5 毫米；全部叶无毛。头状花序果期长 13—18 毫米，含 5 枚舌状小花。外层总苞片小，卵状披针形，长 1—2 毫米，宽不足 0.5 毫米；内层总苞片长椭圆状线形，长 10—14 毫米，宽约 1.5 毫米，5 枚，外面无毛或被蛛丝状短柔毛。舌状小花黄色。瘦果长 5—7 (9) 毫米，宽约 1 毫米，上部无鳞片状突起及冠鳞，顶端无喙或有丘状粗短的喙，喙长 0.1—0.3 (0.5) 毫米。冠毛白色，长 6—8 毫米。花果期 6—9 月。

分布新疆（奇台、哈巴河、富蕴、阿勒泰、布尔津、乌鲁木齐、阜康、尉犁、塔什库尔干、皮山）。生于流动、半固定沙丘，海拔 1 000—3 520 米。俄罗斯（欧洲部分、西伯利亚）、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦有分布。模式标本采自中亚地区。

231. 蒲公英属 *Taraxacum* L.

（见第八十卷第二分册）

232. 异喙菊属 *Heteracia* Fisch. et C. A. Mey.

Fisch. et C. A. Mey., Ind. Sem. Hort. Petrop. **1**: 29. 1835; Benth.