

产黑龙江、吉林、辽宁。生于山坡、路旁及湿地。模式标本采自辽宁开原。

13. 深裂蒲公英 (八一农学院学报) 图版 12: 9—10

Taraxacum stenolobum Stschegl. in Sc. Bull. Soc. Nat. Mosc. 27: 180. 1954; Schischk. Fl. URSS, 29: 496. 1964; Oraz. Fl. Kazak. 9: 481. 1966. et Одув. Казах. и Сред. Азии 129. т. 41. 1975. — *T. obliquum* auct. non Dahlst.: Hand.-Mazz. Monogr. Tarax. 116. 1907. p. p.

多年生草本。根颈部被少量暗褐色残存叶基，叶基腋内有少量褐色弯曲柔毛。叶长圆形或长圆状线形，长 6—17 厘米，宽 8—30 毫米，羽状深裂至几乎全裂，顶端裂片长戟形，稀三角形，全缘，先端急尖或渐尖，每侧裂片 3—5 片，裂片线形或三角状线形，裂片先端急尖，全缘或具齿，倒向、少开展，裂片间有齿或小裂片，疏被蛛丝状毛或无毛，叶基有时显紫红色。花葶 1—6，长于叶，高 8—35 厘米，幼时被绵毛，花时顶端被少量蛛丝状毛，果时几无毛；总苞宽钟状，长 9—15 毫米；外层总苞片淡绿而常带红紫色，披针状卵圆形至披针形，长 6—7 毫米，宽 1.5—3 毫米，伏贴，具窄膜质边，先端钝或渐尖，无角或具不明显的角，较内层总苞片宽或等宽；内层总苞片绿色，先端钝，无角或具小角，长为外层总苞片的 1.5—2 倍；舌状花黄色，花冠无毛，舌片长 9—10 毫米，宽 1—1.5 毫米，基部筒长约 3 毫米，边缘花舌片背面有紫色条纹，柱头暗黄色。瘦果淡灰褐色，长 2.5—3 毫米，具少量纵沟，上部 1/3 具大量小刺，无小瘤，顶端突然收缩为长 0.5—0.8 毫米的喙基，喙纤细，长 7—10 毫米；冠毛白色，长 5—6 毫米。 花果期 6—8 月。

产新疆 (青河、阿勒泰、哈巴河、布尔津)。生于河谷草甸、低山草原。俄罗斯及哈萨克斯坦也有分布。

组 4. 多裂蒲公英组 Sect. 4. Dissecta V. Soest in Proc. Kon. Ned. Acad. Wetensch. ser. C, 69: 377. 1966; Kirschn. et Step. in Taxon 46: 91. 1997. — Sect. *Tibetana* V. Soest subsect. *Dissecta* (Soest) R. Doll in Fedde, Repert. 93: 542. 1982.

瘦果较小，麦秆黄色至淡褐色，具有较短的喙。冠毛白色。总苞片淡绿色，常常带褐色。头状花序较小。外层总苞片伏贴。


本组我国有 2 种。

组模式种：多裂蒲公英 *T. dissectum* (Ledeb.) Ledeb.

1. 外层总苞片无或具极窄的膜质边缘 15. 堆叶蒲公英 *T. compactum* Schischk.
1. 外层总苞片具宽膜质边缘 14. 多裂蒲公英 *T. dissectum* (Ledeb.) Ledeb.

14. 多裂蒲公英 (内蒙古植物志) 图版 5: 6—10

Taraxacum dissectum (Ledeb.) Ledeb. Fl. Ross. 2: 814. 1846. p. p.; Hand.-Mazz. Monogr. Tarax. 47. t. 2, f. 1. 1907. p. p.; Schischk. Fl. URSS, 29: 538.



图版12 1—4. 荒漠蒲公英 *Taraxacum monochlamydeum* Hand.-Mazz.: 1. 植株; 2, 3. 总苞片;

4. 瘦果; 5—8. 长锥蒲公英 *T. longipyramdatum* Schischk.: 5—7. 总苞片; 8. 瘦果;

9, 10. 深裂蒲公英 *T. stenolobum* Stschegl.: 9. 植株; 10. 瘦果。(张荣生绘)